



020412525 Efterafgrøder for optimal plantemasse

Til
Oversigt

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N

Forsøgsplanen er ændret
- se nederst på siden!

Planansvarlig: Linn Vanja
Meilvang
Telefon: /+45 7220 2872
Email:
lvme@teknologisk.dk

Fonden for økologisk landbrug
STØTET AF
Promilleafgiftsfonden for landbrug

FORMÅL: At undersøge efterafgrødeblandinger af nye og kendte arter til undersåning, ud fra arternes egnethed til at blive etableret hhv. sammen med hovedafgrøden og efter ukrudtsbekæmpelse (blindstrigling og radrensning) og teste effekten af fiberfraktionen fra biogas udbragt i foråret på væksten af efterafgrøder.

BAGGRUND: Efterafgrøder spiller en afgørende rolle i næringsstofforsyningen i økologisk produktion. På trods af at betydningen er anerkendt, oplever mange landmænd, at det ikke altid lykkes i tilstrækkelig grad, og at effekten er begrænset og ikke står mål med indsatsen. De undersøede efterafgrøder giver den mest sikre etablering, men giver en begrænsning i forhold til ukrudtsbekæmpelse i hovedafgrøden. Senere såning efter endt ukrudtsbekæmpelse giver en mere usikker fremspiring af efterafgrøden specielt i områder/år med lidt nedbør. Der skal være balance mellem hovedafgrøde og efterafgrøde. Optimalt skal hovedafgrøden ikke generes af efterafgrødens vækst, og efterafgrøden skal have tilstrækkelig plads og lys til at være klar til at tage over efter høst. Samtidig skal efterafgrøden være på et vækststadium, når hovedafgrøden høstes, så den er i stand til hurtigt at gro videre. Valg af såtidspunkt påvirker balancen og vil påvirke arternes egnethed som efterafgrøde. Der skal undersøges nye kombinationer af såtid, afgrøde og efterafgrøder for at registrere samspillet og udvælge gode kombinationer til forskellige dyrkningssituationer. I årets forsøg indgår også efterafgrødernes evne til at optage fosfor og mangan i udvalgte led.

FORSØGSBETINGELSER: Må kun anlægges på arealer, der er omlagt eller under omlægning til økologisk produktion. Efterafgrøder anlægges i en vårbygmark som forventes at have en god vækst, og derfor vil udgøre en normal konkurrence til efterafgrøden. Under disse forhold arbejdes med at forbedre etableringen af efterafgrøden, bl.a. ved at anvende forskellig rækkeafstand. Forsøget anlægges på normal og dobbelt rækkeafstand og der skal være mulighed for radrensning. Sædskiftehistorien i marken over en femårig periode, samt forfrugt ønskes kendt og skrives som et notat til forsøget.

DISPENSATION: Til brug for dispensation til ikke økologisk udsæd skal der gives en orientering til forsøgsværten samt indhentes forsøgsværtens adresse, mail, autorisationsnummer og oplysninger om konsulent. Oplysninger sendes til forsøgsansvarlig, idet eventuelle dispensationer skal indhentes hos Styrelsen for Grøn Arealudvikling og Vandmiljø inden anlæg af forsøget.

ANLÆGSDATA:

- Anlægges som småparcelforsøg.
- Parcellerne anlægges på tværs af agerretningen.
- Led 4-5, der ikke skal blindharves, må placeres ved siden af hinanden, hav værn før og efter til løft/sænk af blindharve (der blindharves langs agerretning). Værnet skal være bredt nok til at blindharvning kan foretages optimalt.
- Hvis forsøget anlægges i 2 kolonner, skal der være tilstrækkelig afstand mellem rækkerne til at traktoren kan komme op i fart til at gennemføre en korrekt radrensning.
- NB! Der skal være værn, så der ikke kommer kørespor i parcellerne, når der radrenses.
- Grupperingen af led 4 og 5 skal randomiseres, så de ikke er ens i de 4 gentagelser, dvs. de ikke må placeres over for hinanden i de 2 kolonner
- Teknologisk Institut skal godkende designet, så meld venligst tilbage mht. til antal rækker og værn hurtigst muligt.
- Husk at det skal være muligt at genfinde/beskrive parcellernes placering på dronfoto, så der kan laves parceludklip.
- Vær sikker på, at det er aftalt med landmanden, at der skal tages planteklip medio oktober, og at han ikke må foretage jordbearbejdning, før i har meldt tilbage at disse er foretaget.

DESIGN DATA: Split-plot, 2 faktorer (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 18m².

Generel behandling:

Kategori	Middel	Omfang	Mgd./ha.	Gprovnr.
Høst og bjærgning	Halm-snitning	Kun forsøg		
Jordbehandling	Pløjning	Kun forsøg		

GENEREL BEHANDLING: Forsøgsarealet gødes som omgivende mark. Halmen snittes ved høst eller fjernes straks efter høst.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:

Faktor 1: Efterafgrøde			
Led	Tid	Behandling, mgd./ha *)	Specifikation, mgd./ha *)
1	Stadium 00 Samsåning med hovedafgrøden	Vårbyg	12,5 cm Rækkeafstand
			4 cm Sådybde
		Blanding nr. 1	3 kg Alm.rajgræs
			3 kg Bibernelle
			1,5 kg Rødkløver
			1 kg Cikorie
	Stadium 03 - 05 3-5 dage efter såning	Blindharvning	
2	Stadium 00	Vårbyg	12,5 cm Rækkeafstand

	Samsåning med hovedafgrøden		4 cm Sådybde
		Blanding nr. 2	3 kg Bibernelle
			1,5 kg Lancet vejbred
			1 kg Cikorie
			2 kg Humlesneglebælg
	Stadium 03 - 05 3-5 dage efter såning	Blindharvning	
3	Stadium 00 Samsåning med hovedafgrøden	Vårbyg	12,5 cm Rækkeafstand
			4 cm Sådybde
		Efterafgrøde	15 kg Alm.rajgræs
	Stadium 03 - 05 3-5 dage efter såning	Blindharvning	
4	Stadium 00 Samsåning med hovedafgrøden	Vårbyg	12,5 cm Rækkeafstand
			2,5 cm Sådybde
		Blanding nr. 2	3 kg Bibernelle
			1,5 kg Lancet vejbred
			1 kg Cikorie
			2 kg Humlesneglebælg
		Ingen blindharvning	
5	Stadium 00 Samsåning med hovedafgrøden	Vårbyg	12,5 cm Rækkeafstand
			2,5 cm Sådybde
		Blanding nr. 3	1,5 kg Rødkløver
			2,5 kg Katost
			2 kg Kællingetand
			2 kg Humlesneglebælg
		Ingen blindharvning	
6	Stadium 00 Samsåning med hovedafgrøden	Vårbyg	12,5 cm Rækkeafstand
			2,5 cm Sådybde
		Blanding nr. 2	3 kg Bibernelle
			1,5 kg Lancet vejbred
			1 kg Cikorie
			2 kg Humlesneglebælg
	Stadium 03 - 05 3-5 dage efter såning	Blindharvning	
7	Stadium 00	Vårbyg	12,5 cm Rækkeafstand
	Stadium 03 - 05 3-5 dage efter såning	Blindharvning	
	Stadium 03 - 05 Såning af efterafgrøde umiddelbart efter blindharvning	Blanding nr. 1	3 kg Alm.rajgræs
			3 kg Bibernelle
			1,5 kg Rødkløver
			1 kg Cikorie
			1,5 cm Sådybde
8	Stadium 00	Vårbyg	12,5 cm Rækkeafstand
	Stadium 03 - 05 3-5 dage efter såning	Blindharvning	
	Stadium 03 - 05 Såning af efterafgrøde umiddelbart efter blindharvning	Blanding 2	3 kg Bibernelle
			1,5 kg Lancet vejbred
			1 kg Cikorie
			2 kg Humlesneglebælg
			1,5 cm Sådybde
9	Stadium 00	Vårbyg	12,5 cm Rækkeafstand
	Stadium 03 - 05 3-5 dage efter såning	Blindharvning	
	Stadium 03 - 05 Såning af efterafgrøde umiddelbart efter blindharvning	Blanding 3	1,5 kg Rødkløver
			2,5 kg Katost
			2 kg Kællingetand
			2 kg Humlesneglebælg
			1,5 cm Sådybde
10	Stadium 00	Vårbyg	12,5 cm Rækkeafstand
	Stadium 03 - 05 3-5 dage efter såning	Blindharvning	
	Stadium 03 - 05 Såning af efterafgrøde umiddelbart efter blindharvning	Blanding 4	3 kg Alm.rajgræs
			1,5 kg Lancet vejbred
			2,5 kg Vinterrybs
			6 kg Alexandrinekløver
			1,5 cm Sådybde
11	Stadium 00	Vårbyg	12,5 cm Rækkeafstand

	Stadium 03 - 05 3-5 dage efter såning	Blindharvning	
	Stadium 03 - 05 Såning af efterafgrøde umiddelbart efter blindharvning. OBS: 1/2 udsædsmængde af efterafgrøde.	Blanding nr. 1	1,5 kg Alm.rajgræs 1,5 kg Bibernelle 0,75 kg Rødkløver 0,5 kg Cikorie 1,5 cm Sådybde
12	Stadium 00	Vårbyg	12,5 cm Rækkeafstand
	Stadium 03 - 05 3-5 dage efter såning	Blindharvning	
	Stadium 03 - 05 Såning af efterafgrøde umiddelbart efter blindharvning. OBS: 1/2 udsædsmængde af efterafgrøde.	Blanding 2	1,5 kg Bibernelle 0,75 kg Lancet vejbred 0,5 kg Cikorie 1 kg Humlesneglebælg 1,5 cm Sådybde
13	Stadium 00	Vårbyg	12,5 cm Rækkeafstand
	Stadium 03 - 05 3-5 dage efter såning	Blindharvning	
	Stadium 03 - 05 Såning af efterafgrøde umiddelbart efter blindharvning. OBS: 1/2 udsædsmængde af efterafgrøde	Blanding 3	0,75 kg Rødkløver 1,25 kg Katost 1 kg Kællingetand 1 kg Humlesneglebælg 1,5 cm Sådybde
14	Stadium 00	Vårbyg	12,5 cm Rækkeafstand
	Stadium 03 - 05 3-5 dage efter såning	Blindharvning	
	Stadium 03 - 05 Såning af efterafgrøde umiddelbart efter blindharvning. OBS: 1/2 udsædsmængde af efterafgrøde.	Blanding 4	1,5 kg Alm.rajgræs 0,75 kg Lancet vejbred 1,25 kg Vinterrybs 3 kg Alexandrinekløver 1,5 cm Sådybde
15	Stadium 00	Vårbyg	25 cm Rækkeafstand
	Stadium 03 - 05 3-5 dage efter såning	Blindharvning	
	Stadium 13 - 15 Når ukrudt har kimblade til første sæt løvblade	Radrensning	
	Stadium 13 - 15 Umiddelbart efter radrensning	Blanding 3	1,5 kg Rødkløver 2,5 kg Katost 2 kg Kællingetand 2 kg Humlesneglebælg 1,5 cm Sådybde
16	Stadium 00	Vårbyg	25 cm Rækkeafstand
	Stadium 03 - 05 3-5 dage efter såning	Blindharvning	
	Stadium 13 - 15 Når ukrudt har kimblade til første sæt løvblade	Radrensning	
	Stadium 13 - 15 Umiddelbart efter radrensning	Blanding 4	3 kg Alm.rajgræs 1,5 kg Lancet vejbred 2,5 kg Vinterrybs 6 kg Alexandrinekløver 1,5 cm Sådybde
17	Stadium 00	Vårbyg	25 cm Rækkeafstand
	Stadium 03 - 05 3-5 dage efter såning	Blindharvning	
	Stadium 13 - 15 Når ukrudt har kimblade til første sæt løvblade	Radrensning	
	Stadium 13 - 15 Umiddelbart efter radrensning	Efterafgrøde	12 kg Vinterrybs 1,5 cm Sådybde
18	Stadium 00	Vårbyg	25 cm Rækkeafstand
	Stadium 03 - 05 3-5 dage efter såning	Blindharvning	
	Stadium 13 - 15 Når ukrudt har kimblade til første sæt løvblade	Radrensning	
	Stadium 13 - 15 Umiddelbart efter radrensning	Efterafgrøde	30 kg Alexandrinekløver 1,5 cm Sådybde
19	Stadium 00 Såning med hovedafgrøden. OBS: 1/2 udsædsmængde af Blanding 1	Vårbyg	25 cm Rækkeafstand 4 cm Sådybde
		Blanding nr. 1	1,5 kg Alm.rajgræs 1,5 kg Bibernelle

			0,75 kg Rødkløver
			0,5 kg Cikorie
Stadium 03 - 05	Blindharvning		
3-5 dage efter såning			
Stadium 13 - 15	Radrensning		
Når ukrudt har kimblade til første sæt løvblade			
Stadium 13 - 15	Blanding 4		1,5 kg Alm.rajgræs
Umiddelbart efter radrensning. OBS: 1/2 udsædsmængde af blanding 4			0,75 kg Lancet vejbred
			1,25 kg Vinterrybs
			3 kg Alexandrinekløver
			1,5 cm Sådybde

Faktor 2: Gødning			
Led	Tid	Behandling, mgd./ha *)	Specifikation, mgd./ha *)
A	Uden fiberfraktion	Ingen kalium	
B	Med fiberfraktion	30 kg K	6,9 t Fiberfraktion, komposteret.
			Nedharvet

*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m²

VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:

Hele forsøgsarealet pløjes når jorden er tjenlig. Fiberfraktion udbringes og nedharves lige inden såning af vårbyggen. Fiberfraktion fra Videbæk Biogas udbringes i led B1-B19. Fiberfraktionen har et indhold på 4,35 kg K/ton, hvilket betyder at der skal udbringes 6,9 ton/ha.

Led 1-3:

- Hovedafgrøden sås med 12,5 cm rækkeafstand og i 4 cm's dybde.
- Efterafgrøden sås sammen med hovedafgrøden i samme rille og i 4 cm's dybde.
- Der blindharves.

Led 4-5:

- Hovedafgrøden sås med 12,5 cm rækkeafstand og i 2,5 cm's dybde.
- Efterafgrøden sås sammen med hovedafgrøden i samme rille og i 2,5 cm's dybde.
- Der blindharves ikke.

Led 6:

- Hovedafgrøden sås med 12,5 cm rækkeafstand og i 2,5 cm's dybde.
- Efterafgrøden sås sammen med hovedafgrøden i samme rille og i 2,5 cm's dybde.
- Der blindharves.

Led 7-14:

- Hovedafgrøden sås med 12,5 cm rækkeafstand og i 4 cm's dybde.
- Der blindharves.
- Umiddelbart efter blindharvning sås efterafgrøden ca. midt i mellem rækkerne af hovedafgrøden. Efterafgrøden sås i 1,5 cm dybde.

Led 15-18:

- Hovedafgrøden sås med 25 cm rækkeafstand i 4 cm's sådybde.
- Der blindharves.
- Der radrenses, når ukrudtet har kimblade til det første sæt løvblade.
- Umiddelbart efter radrensning sås efterafgrøden ca. midt i mellem rækkerne af hovedafgrøden. Efterafgrøden sås i 1,5 cm dybde.

Led 19: OBS. To gange såning af efterafgrøde.

- Hovedafgrøden sås med 25 cm rækkeafstand og i 4 cm's dybde.
- Efterafgrøden sås sammen med hovedafgrøden i samme rille og i 4 cm's dybde.
- Der blindharves.
- Der radrenses, når ukrudtet har kimblade til det første sæt løvblade.
- Umiddelbart efter radrensning sås efterafgrøden ca. midt i mellem rækkerne af hovedafgrøden. Efterafgrøden sås i 1,5 cm dybde.

OBS: Der skal være samme udsædsmængde i vårbyg i alle led uanset rækkeafstand. Der tilstræbes et plantetal på 350 planter pr. m2 i alle led.

GØDNING: Fiberfraktion samt kompost leveres direkte fra Videbæk biogas. Levering koordineres af Anna Borum abor@icoel.dk.

UDSÆD: Såsæd til hovedafgrøden skaffes lokalt. Såsæd til efterafgrøde udvejet til småparceller leveres af Teknologisk Institut.

Måletider

Niveau		Måleparameter	Analyse
P01	Stadium 00, Ved anlæg		
	Forsøg	JB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.	
	Forsøg	JORDPRØVE-UDT. N-min til Agrolab (plastpose). En repræsentativ jordprøve i 0-75 cm dybde udtages, dog ved JB nr. 1 og 3 i 0-50 cm dybde. Prøven nedfrys ses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. OBS: Graveforespørgsel foretages	N-MIN, prøvedybde, cm
			N-MIN, kg i prøvedybde
			NH4-N, ppm i prøvedybde
			NO3-N, ppm i prøvedybde
			TØRSTOF, % i prøvedybde

	Forsøg	JORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose). Prøvestørrelse 300-400 g	KT, 0 -25 cm dybde MGT, 0 -25 cm dybde PT, 0 -25 cm dybde RT, 0 -25 cm dybde
P02	Stadium 15, 14 dage efter sidste såning		
	Parcel	FREMSPIRING karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand. Bedømmelse af hovedafgrøden	
P03	Stadium 51, Ved skridning		
	Parcel	UKRUDT % dækning af jord.	
	Parcel	UDLÆG/EFTERAFGR. % dækning af jord.	
P04	Stadium 89, Før høst		
	Parcel	UKRUDT % dækning af jord.	
	Parcel	PLANTEHØJDE EFTERAFGRØDE cm. Måles med tommestok, som en gennemsnitlig højde. IKKE plademåler.	
	Parcel	UDLÆG/EFTERAFGR. % dækning af jord.	
	Parcel	LEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.	
P05	Stadium 90, Ved høst		
	Forsøg	FAGLIG VURDERING dato for.	
	led	KERNE/FRØ-PRØVE til Teknologisk Institut. Der udtages en prøve på 250 gr. pr. parcel. Prøverne kan samles til en ledprøve eller forblive i hver sin plastpose og påklæbes hver sin høstlabel.	VAND, % i kerne/frø RENHED, % i råvare RÅPROTEIN, % i tørstof HL-VÆGT, kg
	Parcel	PARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).	
	Parcel	SPILD hkg/ha.	
P06	15-10-2025, Oktober		
	led	Udføres kun i følgende led: A1, B1, A2, B2, A4, B4, A5, B5, A6, B6, A10, B10, A11, B11, A12, B12, A13, B13, A14, B14, A15, B15, A19, B19 PLANTEPRØVE-UDT. til AgroLab. Planteprov til Arealbestemt kvælstofoptagelse (metode 1). Se tekstafsnit PLANTEPRØVE.	PLANTEMATERIALE (EFTER VASK), kg i planteprov TØRSTOF, % i planteprov C/N FORHOLD, N, % i ts (mineralstofanalyse) KULSTOF, % i tørstof
	Parcel	KVIK skud/m2.	
	Parcel	UKRUDT % dækning af jord.	
	Parcel	PLANTEHØJDE EFTERAFGRØDE cm. Måles med tommestok, som en gennemsnitlig højde. IKKE plademåler.	
	Parcel	UDLÆG/EFTERAFGR. % dækning af jord.	
	Parcel	SPILDKORNS-PL. % dækning af jord.	
	Parcel	RODUKRUDT planter/m2, excl. kvik, tælleflade: Parcel.	
	Parcel	NDRE-REFLEKTANS Drone.	
	Parcel	NDVI-REFLEKTANS Drone.	
	Parcel	NDRE, std. afv. .	
	Parcel	NDVI, std. afv. .	
	Parcel	Udføres kun i følgende led: A1, B1, A7, B7, A10, B10, A11, B11, A14, B14, B16, A19, B19 *1 . Alm. rajgræs. Karakter 0-10, hvor meget dækker arten af hele blandingen. Se tekstafsnit EFTERAFGRØDE I BLANDINGERNE,	
	Parcel	Udføres kun i følgende led: A1, B1, A2, B2, A4, B4, A6, B6, A7, B7, A8, B8, A11, B11, A12, B12, A19, B19 *2 . Bibernelle. Karakter 0-10, hvor meget dækker arten af hele blandingen. Se tekstafsnit EFTERAFGRØDE I BLANDINGERNE,	
	Parcel	Udføres kun i følgende led: A1, B1, A5, B5, A7, B7, A9, B9, A11, B11, A13, B13, A15, B15, A19, B19 RØDKLØVER karakter 0-10, 0=ingen rødkløver, 10=total dækning. Karakter 0-10, hvor meget dækker arten af hele blandingen. Se tekstafsnit EFTERAFGRØDE I BLANDINGERNE,	
	Parcel	Udføres kun i følgende led: A1, B1, A2, B2, A4, B4, A6, B6, A7, B7, A8, B8, A11, B11, A12, B12, A19, B19 CIKORIE karakter 0-10, 0=ingen cikorie, 10=total dækning. Karakter 0-10, hvor meget dækker arten af hele blandingen. Se tekstafsnit EFTERAFGRØDE I BLANDINGERNE,	
	Parcel	Udføres kun i følgende led: A2, B2, A4, B4, A6, B6, A8, B8, A10, B10, A12, B12, A14, B14, A16, B16, A19, B19 *3 . Lancet vejbred. Karakter 0-10, hvor meget dækker arten af hele blandingen. Se tekstafsnit EFTERAFGRØDE I BLANDINGERNE,	

	Parcel	Udføres kun i følgende led: A2, B2, A4, B4, A5, B5, A6, B6, A8, B8, A9, B9, A12, B12, A13, B13, A15, B15 *4 . Humlesneglebælg. Karakter 0-10, hvor meget dækker arten af hele blandingen. Se tekstafsnit ETERAFGRØDE I BLANDINGERNE,	
	Parcel	Udføres kun i følgende led: A5, B5, A9, B9, A13, B13, A15, B15 *5 . Katost. Karakter 0-10, hvor meget dækker arten af hele blandingen. Se tekstafsnit ETERAFGRØDE I BLANDINGERNE,	
	Parcel	Udføres kun i følgende led: A5, B5, A9, B9, A13, B13, A15, B15 KÆLLINGETAND karakter 0-10, 0=ingen kællingetand, 10=total dækning. Karakter 0-10, hvor meget dækker arten af hele blandingen. Se tekstafsnit ETERAFGRØDE I BLANDINGERNE,	
	Parcel	Udføres kun i følgende led: A10, B10, A14, B14, A16, B16, A19, B19 *6 . Vinterrybs. Karakter 0-10, hvor meget dækker arten af hele blandingen. Se tekstafsnit ETERAFGRØDE I BLANDINGERNE,	
	Parcel	Udføres kun i følgende led: A10, B10, A14, B14, A16, B16, A19, B19 *7 . Alexandrinerkløver. Karakter 0-10, hvor meget dækker arten af hele blandingen. Tekstafsnit ETERAFGRØDE I BLANDINGERNE,	
P07	15-10-2025, Oktober		
	Alle målinger i P07 udføres kun i led: A3, B3, A7, B7, A8, B8, A9, B9, A16, B16, A17, B17, A18, B18		
	led	PLANTEPRØVE-UDT. til AgroLab. Planteprøve til Arealbestemt kvælstofoptagelse (metode 1). Se tekstafsnit PLANTEPRØVE.	P, % i ts (mineralstofanalyse) C/N FORHOLD, KULSTOF, % i tørstof N, % i ts (mineralstofanalyse) PLANTEMATERIALE (EFTER VASK), kg i planteprøve TØRSTOF, % i planteprøve MN, ppm i ts (mineralstofanalyse)

GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af LFE. Det er vigtigt at foretage graveforespørgslen i god tid inden jordprøven skal udtages. se vejledningen: [Ledningsejerregistret \(LER\)](#).

SYGDOMSFØREKOMST: Ved forekomst af sygdomme i hovedafgrøden indberettes dette som notat på forsøget.

PLANTEPRØVE: Der udtages prøver til arealbestemt kvælstofbestemmelse (metode 1), se vejledningen: [Udtagning af planteprøver til bestemmelse af arealbestemt næringsstofoptagelse](#).

I led 3, 7, 8, 9, 16, 17 og 18 bestemmes også P og Mn. For at systemet kan håndtere data korrekt, så følgesedler bliver rigtige, er der indsat en ekstra måletid (P07) for disse led.

EFTERAFGRØDE I BLANDINGERNE:

Efterafgrøde vurderes på en skala fra 0-10. 0 - arten kan ikke findes. 10 – arten udgør hele efterafgrøden.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med type, mængde og dato. Forsøget afsluttes med et notat i WebTrialOffice vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

Følgende forhold beskrives i notat:

- Vejret ved behandling
- Beskrivelse af såbed ved etablering
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

MEDFINANSIERING: Projektet har fået tilskud fra Promilleafgiftsfonden og Fonden for Økologisk Landbrug.

KONTAKTPERSON - ØKOLOGI: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Chefkonsulent Inger Bertelsen: 40 34 21 71 eller på mail: iber@icoel.dk

Rettelser:

Dato	Tekst
12-05-2025	Fejl i tilskudstekst rettet.

Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk