

Økologi, Fjerkræ

## Regler for økologiske slagtekyllinger

Det følgende giver i kort form overblik over de vigtigste regler inden for økologisk opdræt af slagtekyllinger og et eksempel på et omlægningsforløb.

Viden om Opdateret 17. maj 2022

En fuldstændig oversigt over EU-regler findes i Landbrugsstyrelsens [Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion](#). Se [lbst.dk/okologi](#).

### Omlægning eller indsættelse af dyr

- Alt fjerkræ skal være under økologisk produktion inden for to år fra påbegyndt omlægning – ellers har du samtidig drift af en økologisk og en ikke-økologisk produktionsenhed.
- Fjerkræhold, der udelukkende er til eget forbrug, behøver du ikke omlægge.
- Kyllinger skal være økologiske eller under tre dage gamle ved indsættelse i det økologiske system. Se udbud af økologiske dyr på [OrganicXLivestock.dk](#).
- Se et eksempel på et omlægningsforløb i figuren nederst på siden.

Afgrødetype til foder	Konventionel afgrøde	Omlægningsafgrøde	Økologisk afgrøde
Etårige afgrøder (korn, majs, roer, grønsager m.m.)	Afgrøden er sået før påbegyndt omlægning, eller afgrøden høstes mindre end 12 mdr. efter, jorden er påbegyndt omlægning	Afgrøden er sået efter påbegyndt omlægning, og afgrøden høstes mindst 12 mdr. efter, jorden er påbegyndt omlægning	Afgrøden er sået mindst 24 mdr. efter, jorden er påbegyndt omlægning.
Græs/permanent græs (inkl. kløvergræs, frøgræs, kløverfrø, lucerne)	Afgrøden høstes mindre end 12 mdr. efter, jorden er påbegyndt omlægning	Afgrøden høstes mindst 12 mdr. efter, jorden er påbegyndt omlægning.	Afgrøden høstes mindst 24 mdr. efter, jorden er påbegyndt omlægning.

### Foder, grovfoder og tilsætningsstoffer

- 30 % af foderrationen (pr. dyr pr. år) skal være produceret på egen bedrift eller i samme region (DK).
- I mineralblandinger må der bruges op til 1 % ikke-økologiske urter, krydderier og melasse som bindemiddel (pr. dyr pr. år).
- Indtil den 31. december 2026 må der anvendes 5 % ikke-økologisk proteinfoder til ungfjerkræ (slagtekyllinger), hvis økologisk foder ikke kan skaffes.



- Mineraler og fiskemel er eksempler på fodermidler, der ikke er af landbrugsoprindelse og tæller derfor ikke med i de 5 % ikke-økologisk foder. Vær dog opmærksom på, at slagterierne ikke tillader fiskemel i voksefoder.
- Omlægningsfoder fra bedriftens egne arealer kan udgøre 100 % af foderet (i procent af tørstof af landbrugsoprindelse). Op til 25 % være indkøbt omlægningsfoder regnet pr. kalenderår. Indkøbt omlægningsfoder kan erstatte de 5 % ikke-økologisk foder.
- Foder fra egne marker med flerårige foderafgrøder og proteinafgrøder i første omlægningsår kan anvendes med op til 20 % af foderrationen (i procent af tørstof pr. dyr pr. år). Det kan være proteinafgrøder som ærter, hestebønner, lupin eller blandinger af korn og bælgssæd, samt flerårige foderafgrøder som kløver, græs og lucerne. Gælder også ved lejet græsningsret.
- Foderet må ikke være fremstillet ved brug af kemiske opløsningsmidler, f.eks. skråprodukter.
- Foder, der består af eller er fremstillet ved brug af genetisk modificerede organismer (gmo), må ikke anvendes.
- Foderet må kun indeholde mineralske fodermidler og fodertilætningsstoffer som fremgår af bilag 3 i [Vejledningen om økologisk jordbrugsproduktion](#).
- Foderet må f.eks. ikke indeholde antibiotika eller andre lægemidler, farvestoffer, syntetiske aminosyrer eller lignende.
- Kyllinger skal fra 3 dages alderen tildeles grovfoder, så de er beskæftiget i dagtimerne, f.eks. ensilage, frisk grønt, hø, rodfrugter og grøntsagsrester.

Staldtyper	Nettoareal	Flokstørrelse	Minimum udeareal	Siddepinde /platform
Faste huse	10 dyr/m <sup>2</sup> dog højst 21 kg levendevægt/m <sup>2</sup>	4.800	4 m <sup>2</sup>	5 cm siddepind eller mindst 25 cm <sup>2</sup> hævede platforme pr. kylling
Mobile huse (under 150 m <sup>2</sup> , og som flyttes mellem hvert hold)	16 dyr/m <sup>2</sup> dog højst 30 kg levendevægt/m <sup>2</sup>	4.800	4 m <sup>2</sup>	5 cm siddepind eller mindst 25 cm <sup>2</sup> hævede platforme pr. kylling

## Stalde

- Stalde til slagtekyllinger må maksimalt være 1.600 m<sup>2</sup>. Der kan være flere stalde på en bedrift.
- Der skal være tilstrækkeligt med dagslys i stalden. Naturligt lys igennem vinduer og åbninger som kan suppleres med kunstig belysning (20 lux i 80 % af staldens nettoareal iflg. [Bek. nr. 1747 om dyrevelfærdsmæssige mindstekrav til hold af slagtekyllinger og rugeægproduktion til produktion af slagtekyllinger samt om uddannelse ved hold af slagtekyllinger](#)).
- Der skal være en natlig hvileperiode uden kunstigt lys på minimum 8 timer.
- Ammoniakkoncentrationen i stalden må ikke overstige 25 ppm.
- Mindst 1/3 af staldens gulvareal skal kunne anvendes som skrabe- og støvbadningsareal. Det skal være dækket af tør og porøs strøelse, som kan bestå af sand, jord, halm eller lign.
- Mobile huse til slagtekyllinger skal overholde krav i [Byggebladet om indretning og flytning af mobile huse til økologiske slagtekyllinger](#).
- Stalden skal have mindst 4 m ind- og udgangshuller per 100 m<sup>2</sup> staldareal (nettoareal). Mellem inderstald og en AUB (anden udendørs tagbelagt bygningsdel, tidligere veranda) skal der være mindst 2 m ind- og udgangshuller per 100 m<sup>2</sup> nettoareal.
- En AUB kan regnes med til nettoarealet, hvis kyllingerne har fri adgang hele døgnet og hele året.

## Udearealer (høsegård)

- Økologiske slagtekyllinger skal have adgang til udearealet mindst en tredjedel af livet. For at sikre dette skal kyllinger have adgang til udearealet ved ca. 3 ugers alderen, og når vejrforholdene tillader det.
- Udearealer til økofjerkræ skal have været under omlægning i mindst 12 måneder.
- Udearealer til fjerkræ skal være attraktive og overvejende dækket af vegetation som skal bestå af forskellige plantearter. Du skal sørge for, at vegetationen vedligeholdes, så der ikke sker udsivning af næringsstoffer.
- Du skal sørge for, at dyrene anvender hele udearealet jævnt fordelt.
- Der skal etableres ly, buske eller træer fordelt over hele udearealet. Hvis afstanden til yderste ende af høsegården overstiger 150 m, skal der være mindst fire steder med ly, buske og træer jævnt fordelt over hele udearealet.
- Der skal være en tomgangsperiode mellem to flokke, som sikrer, at vegetationen kan gro frem igen, og at vegetationskravene er opfyldt for den efterfølgende flok.



## Slagtealder og vækst

- Kyllinger, der er økologiske ved indsættelsen og langsomt voksende, kan slagtes når som helst (f.eks. 63 dage).
- Kyllinger, der er ikke-økologiske ved indsættelsen og langsomt voksende, kan slagtes efter omlægningsperioden på 10 uger (70 dage).
- Kyllinger, der ikke er langsomt voksende, må tidligst slagtes efter 81 dage.
- Langsomt voksende kyllingeracers tilvækst må maksimalt være på 38 g/dag (gennemsnit over tre på hinanden følgende hold).

## Behandling og velfærd

- Særlige regler for velfærd omfatter bl.a. max. grænser for dødelighed og fjerpilning.
- Ved problemer med fjerpilning - se [Hjælpekema til udarbejdelse af handlingsplan for fjerkræ på lbst.dk](#).
- Næbtrimning er ikke tilladt.
- Vaccination og parasitbehandling er tilladt, og det tæller ikke som en behandling.
- Tilbageholdelsestiden ved behandling med veterinære lægemidler er to gange den normale tilbageholdelsestid dog altid mindst 48 timer undtaget for vacciner. Det gælder f.eks. ved parasitbehandling.
- Kyllinger, der er behandlet med f.eks. antibiotika mere end én gang, kan ikke sælges som økologiske

## Husdyr-/medicinlogbog

- Alle behandlinger og indgreb i flokken skal føres i en medicinlogbog, som er en del af den samlede logbog for husdyrproduktionen.
- Oversigt over flokke med registrering af tilgang, afgang og døde dyr skal fremgå af logbogen.
- Adgang til udeareal, foldskifte og tomgangsperiode skal fremgå af logbogen.

### Vær opmærksom på:

- At Landbrugsstyrelsen certificerer bedriften til økologi, og kontrollerer den mindst en gang om året.
- At du skal indsende oplysninger om bedriften hvert år i fællesskemaet i april.
- At du (eller en medarbejder) skal have gennemført et lovpligtigt kursus om slagtekyllinger inden etablering.
- At husdyrholdet skal være registreret/opdateret i CHR. Se [landbrugsindberetning.dk](#).
- At du kan søge tilskud til økologisk dyrkede arealer fra Landbrugsstyrelsen. Se [lbst.dk/tilskudsguide](#).


Find flere oplysninger om økologisk fjerkræhold:

- [icoel.dk](#)
- [LandbrugsInfo.dk/fjerkræ](#)

## Grafisk fremstilling af omlægning



## EKSEMPEL PÅ OMLÆGNING TIL ØKOLOGISK SLAGTEKYLLINGER 1. APRIL 2022



[Hent omlægningsgrafik som pdf.](#)

Se eller hent Regler for økologiske slagtekyllinger

### Emneord

Fjerkræstalde

Fodring

Slagtekyllinger

+1

### Økologi

## Tema: Omlægning til økologisk landbrug

Overvejer du at omlægge til økologi? Eller har du taget beslutningen om at drive din bedrift økologisk? Der kan være mange ting at holde styr på, når man skal starte en økologisk landbrugsproduktion. Her giver vi dig overblikket over de vigtigste ting, du...

Publiceret: 12. december 2019

Opdateret: 17. maj 2022

## Vil du vide mere?



### Sofie Knorr Jensen

Fjerkræskonsulent/projektleder

Innovationscenter for Økologisk Landbrug P/S

[sokj@icoel.dk](mailto:sokj@icoel.dk)



### Niels Finn Johansen

Konsulent

Innovationscenter for Økologisk Landbrug P/S



[njoh@icoel.dk](mailto:njoh@icoel.dk)  
21717768



**Birgit Ingvorsen**

Landskonsulent

Innovationscenter for Økologisk Landbrug P/S

[biin@icoel.dk](mailto:biin@icoel.dk)

+45 2374 3798



**Jette Søholm Petersen**

Chefkonsulent

SEGES

[jtp@seges.dk](mailto:jtp@seges.dk)

+45 2171 7715

## Støttet af

Promilleafgiftsfonden for landbrug



Innovationscenter for Økologisk Landbrug udvikler ny viden og løsninger til landmænd og rådgivere. Sammen udvikler vi et mere bæredygtigt landbrug.

SEGES Innovation P/S    Tlf.    8740 5000  
Agro Food Park 15    Fax.    8740 5010  
8200 Aarhus N    Email    [info@seges.dk](mailto:info@seges.dk)

