

Forside (/) / Klima (/klima/) /

Normtal for beregning af klimaafttryk kan ramme skævt for økologiske grise og fjerkræ (/klima/normtal-for-beregning-af-klimaafttryk-kan-ramme-skaevt-for-oekologiske-grise-og-fjerkrae/)

Udgivet 12.08.2026

Normtal for beregning af klimaafttryk kan ramme skævt for økologiske grise og fjerkræ

De nuværende normtal, der danner grundlag for at beregne klimaafttryk fra grisehold og fjerkræproduktion, er ofte baseret på konventionel produktion og tager derfor ikke tilstrækkeligt hensyn til, at en stor del af gødningen i økologisk produktion afsættes direkte på marken. Det kan give misvisende beregninger af både gødningsværdi, klimaafttryk og en kommende klimaafgift.

Af Erik Fog, Julie Cheron Schmidt Henriksen

I økologisk griseproduktion opholder søer og pattegrise sig på friland, mens smågrisene ofte går ude, indtil den egentlige slagtesvineproduktion begynder. En væsentlig del af gødningen bliver derfor afsat direkte på udearealerne frem for at blive opsamlet i stald og gødningslager. Det gælder også for økologisk fjerkræproduktion.

En ny analyse fra Innovationscenter for Økologisk Landbrug viser, at de nuværende normtal for beregning af klimaafttryk fra disse produktioner ikke tager tilstrækkeligt højde for forskellene mellem økologisk og konventionel produktion og dermed kan give en misvisende klimaberegning.

Gødning på marken giver færre emissioner

Det har stor betydning for klimaberegninger, om gødning afsættes direkte på marken eller først opsamles og opbevares. Udledningerne fra stald og lager er markant højere. For metan kan forskellen ifølge analysen være omkring en faktor 100.

Når gødning fra økologiske søer, pattegrise og smågrise alligevel behandles som stald- og lagergødning, bliver udledningen af drivhusgasser overvurderet. Det kan reducere bedriftens beregnede gødningsværdi og påvirke både gødningsplanlægning, udbytter og arealbehov.

Risiko for at beregne et for højt klimaafttryk

Der findes kun begrænsede klimadata for økologisk grisekød og fjerkræprodukter. Derfor anvendes der ofte data fra konventionel produktion, selv om produktionssystemerne er forskellige. I økologisk produktion er der blandt andet mindre bygningsmasse og mindre gødning i stald og lager. Samtidig bidrager den gødning, som afsættes på marken, til næringsstofforsyningen af græs og efterfølgende afgrøder, ligesom træer i hønsegården opsamler kulstof.

- Hvis disse forhold ikke indgår korrekt, bliver klimaaftrykket pr. dyr og pr. kg økologisk kød og æg ikke beregnet retvisende, vurderer Julie Cheron Schmidt Henriksen fra Innovationscenter for Økologisk Landbrug.

Vigtigt for en kommende klimaafgift

En kommende CO₂e-afgift på husdyr forventes at tage udgangspunkt i de nationale emissionsopgørelser, hvor der mangler normer for økologisk grise- og fjerkræproduktion.

- Det bliver derfor afgørende for de økologiske producenter, at klimaafgiften beregnes korrekt på basis af økologiske normtal. Det vil bl.a. kræve, at forskerne snarest muligt får mulighed for at beregne de korrekte økologiske normtal, siger Julie Cheron Schmidt Henriksen.


Måske er du også interesseret i



05.08.2026

Ny analyse af klimaaftrykket fra økologisk fjerkræ på vej

Innovationscenter for Økologisk Landbrug barsler med nye beregninger, der vil...



31.08.2026

Klimaaftryk på bedriftsniveau: betydningen af import

Import af foder og andre hjælpestoffer har stor betydning for bedriftens...



14.04.2026

Omlægning fra konventionel til økologisk mælkeproduktion giver lavere klimaaftryk

Innovationscenter for Økologisk Landbrug dokumenterer i en rapport,...



29.01.2026

Emissionsfaktor for lattergas – hvad er det, og hvad bruges den til?

Lattergas er en potent drivhusgas, som udledes, når kvælstof omsættes i jorden....



06.01.2026

Hvor stor en del af gødningen ender som lattergas?

Gødning er den største kilde til drivhusgasudledning i planteavlen, og det er...



18.12.2025

Styrket grøn profil – dokumentér værdien af din indsats


Den grønne omstilling giver nye muligheder for landmænd, der arbejder målrettet med klima...



16.12.2025

Klimagødning: Vælg gødning med høj udnyttelse og lav udledning af lattergas

Med høje udbytter og lav lattergasudledning kan man opnå lave totale udledninger...



28.11.2025

Klimavirkemidler i økologisk planteavl relateret til afgrødevalg og - dyrkning

Afgrøder med stort kvælstofoptag og efterafgrøder i sædskiftet er...



28.11.2025

Klimavirkemidler i økologisk planteavl relateret til ekstensivering


Hæv vandstanden på organojorde og etabler bræmmer langs vandløb og...



28.11.2025

Klimavirkemidler i økologisk planteavl relateret til gødsning


Klimaoptimeret gødsning ved f.eks. nedfældning eller anvendelse af plantebaseret...



28.11.2025

Klimavirkemidler i økologisk planteavl relateret til maskinarbejde

Reduceret dieselforbrug og pløjefri dyrkning er nogle af de muligheder, du har for at...



05.11.2025

Klimavirkemidler i økologisk kvæghold

Hyppig gylleudslusning og optimeret grovfoderproduktion er nogle af de muligheder, so...

Tilmeld dig vores ugentlige nyhedsbrev

Kontakt



Erik Fog

Chefkonsulent

+45 51 80 86 69

eikf@icoel.dk



**Julie Cherono Schmidt
Henriksen**

Teamleder for Klima og natur,
chefkonsulent

+45 29 39 46 48

jcsh@icoel.dk