

[Forside \(/\)](#) / [Regler \(/regler/\)](#) / [Regler for økologisk ægproduktion \(/regler/regler-for-oekologisk-aegproduktion/\)](#)
Udgivet 01.02.2026

Regler for økologisk ægproduktion

Det følgende giver i kort form overblik over de vigtigste regler for økologisk ægproduktion og et eksempel på et omlægningsforløb.

Af Birgit Ingvorsen

En fuldstændig oversigt over EU-regler findes i Styrelsens [Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion \(lbst.dk\)](#) (<https://lbst.dk/bedrift/oekologi/bliv-certificeret-oekolog/oekologisk-jordbrugsproducent>).

Omlægning eller indsættelse af dyr

- Fjerkræhold, der udelukkende er til eget forbrug, behøver du ikke omlægge til økologisk produktion.
- Kyllinger skal være økologiske eller under tre dage gamle ved indsættelse i det økologiske system. Ikke-økologiske høner/hønniker kan ikke omlægges til økologisk ægproduktion.

Se eksempel på et omlægningsforløb nederst på siden.

Foder, grovfoder og tilsætningsstoffer

Afgrødetyper til foder	Konventionel afgrøde	Omlægningsafgrøde	Økologisk afgrøde
Etårige afgrøder (korn, majs, roer, grønsager m.m.)	Afgrøden er sået før påbegyndt omlægning, eller afgrøden høstes mindre end 12 mdr. efter, jorden er påbegyndt omlægning	Afgrøden er sået efter påbegyndt omlægning, og afgrøden høstes mindst 12 mdr. efter, jorden er påbegyndt omlægning	Afgrøden er sået mindst 24 mdr. efter, jorden er påbegyndt omlægning.
Græs/permanent græs (inkl. kløvergræs, frøgræs, kløverfrø, lucerne)	Afgrøden høstes mindre end 12 mdr. efter, jorden er påbegyndt omlægning	Afgrøden høstes mindst 12 mdr. efter, jorden er påbegyndt omlægning.	Afgrøden høstes mindst 24 mdr. efter, jorden er påbegyndt omlægning.

*) Se dog undtagelse for proteinafgrøder til foder (20 %-regel).

- 30 % af foderrationen (pr. dyr pr. år) skal være produceret på egen bedrift eller i samme region (Danmark).

- Indtil 31. december 2026 må der anvendes 5 % ikke-økologisk proteinfoder til ungfjerkræ, hvis økologisk foder ikke kan skaffes. Æglæggere er unge, indtil de er stabile i æglægning og vægt (omkring leveuge 30).
- Mineraler og fiskemel er eksempler på fodermidler, der ikke er af landbrugsoprindelse, og derfor tæller disse ikke med i de 5 % ikke-økologisk foder.
- Omlægningsfoder fra bedriftens egne arealer kan udgøre 100 % af foderet (i procent tørstof af landbrugsoprindelse). Op til 25 % kan være indkøbt omlægningsfoder regnet pr. kalenderår. Indkøbte omlægningsafgrøder og foder fra egne førsteårsmarker må tilsammen kun udgøre 25 % af den samlede foderration.
- Foder fra egne marker med flerårige foderafgrøder og proteinafgrøder i første omlægningsår kan anvendes med op til 20 % af foderrationen (i procent af tørstof pr. dyr pr. år). Det kan være proteinafgrøder som ærter, hestebønner, lupin eller blandinger af korn og bælgsæd, samt flerårige foderafgrøder som kløver, græs og lucerne. Gælder også ved lejet græsningsret.
- Foderet må ikke være fremstillet ved brug af kemiske opløsningsmidler, f.eks. skråprodukter.
- Foder, der består af eller er fremstillet ved brug af genetisk modificerede organismer (gmo), må ikke anvendes.
- Foderet må kun indeholde mineralske fodermidler og fodertilsætningsstoffer, som fremgår i bilag 3 i [Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion \(lbst.dk\)](https://lbst.dk/bedrift/oekologi/bliv-certificeret-oekolog/oekologisk-jordbrugsproducent) (<https://lbst.dk/bedrift/oekologi/bliv-certificeret-oekolog/oekologisk-jordbrugsproducent>).
- Fjerkræ skal fra tre dages alderen tildeles grovfoder, så de er beskæftiget i dagtimerne, f.eks. ensilage, frisk grønt, hø, rodfrugter og grøntsagsrester. Under indelukningskrav pga. fugleinfluenza skal fjerkræ have permanent adgang til grovfoder.

Stalde til økologiske æglæggere og levekyllinger

- Der er særlige arealkrav og regler for flokstørrelse og redekasser samt pladskrav til forskellige typer af vand- og fodringssystemer.
- Der skal være tilstrækkeligt med dagslys i stalden i form af naturligt lys fra vinduer og åbninger suppleret med kunstigt lys.
- Der skal være en natlig hvileperiode uden kunstigt lys på 8 timer. For levekyllinger fra dag 0 til dag 5 kan mørkeperioden dog opdeles i 2 gange minimum 4 timer, hvor der er en periode med lys på op til to timer. Lysperioden på 2 timer skal sikre, at dyrene får adgang til foder og vand.
- Ammoniakkoncentrationen i stalden må som udgangspunkt ikke overstige 25 ppm.
- Mindst 1/3 af staldens gulvareal skal kunne anvendes som skrabe- og støvbadningsareal. Det skal være dækket af tør og porøs strøelse, som kan bestå af sand, jord, halm eller lign.
- Stalden skal have mindst fire meter ind- og udgangshuller per 100 m² staldareal (nytteareal). Mellem inderstald og en AUB (anden udendørs tagbelagt bygningsdel, tidligere veranda), skal der være mindst to meter ind- og udgangshuller per 100 m² nytteareal.

- En AUB kan regnes med til nettoarealet, hvis fjerkræet har fri adgang hele døgnet og hele året rundt.
- Stalde til høns og levekylinger må højst have tre etager inkl. gulvareal. Frihøjden mellem etagerne skal være mindst 45 cm. Drikke- og fodringsanlæg skal være fordelt i hele stalden, og etagerne skal være indrettet, så gødningen ikke falder igennem.

Udearealer (hønsegård)

- Om dagen skal økologisk fjerkræ have adgang til udearealet fra så ung en alder, som det er praktisk muligt, og så snart deres fysiologiske og fysiske kondition tillader det. Det skal være mindst en tredjedel af deres liv. For at sikre dette, skal levekylinger have adgang til udearealet, når dyrene er fuldfjerede ved ca. seks til syv-ugers alderen, og vejrforholdene tillader det.
- Udearealer til økologisk fjerkræ kan anvendes fra omlægningens start, hvis det dokumenteres, at græsoptaget de første 12 mdr. ikke overstiger 20 % af den samlede foderration på årsbasis (regler for proteinafgrøder i første omlægningsår).
- Udearealer til fjerkræ skal overvejende være dækket af vegetation, som skal bestå af forskellige plantearter. Du skal sørge for, at vegetationen vedligeholdes, så der ikke sker udsivning af næringsstoffer.
- Der skal etableres ly, buske eller træer, som er fordelt over hele udearealet. Hvis afstanden til yderste ende af hønsegården overstiger 150 meter, skal der være mindst fire steder med ly, buske og træer, som er jævnt fordelt over hele udearealet.
- Det anbefales, at mindst 70 % af udearealet er beplantet og mindst 50 % med træer og/eller buske til at sikre ly, læ og skjul. For at sikre flyverskjul hele året anbefales stedsegrønne planter og buske.
- Du skal sikre, at hønerne spreder sig ud og benytter hele udearealet.
- Der skal være en tomgangsperiode mellem to flokke, som sikrer, at vegetationen kan gro frem igen, og at vegetationskravene er opfyldt for den efterfølgende flok.

Fjerkrætyper	Nytteareal	Flokstørrelse	Minimumsareal ude	Siddepinde/platform
Lægge- / avlshøner	6 dyr/m ²	3.000	4 m ² / høne	18 cm pr. høne
Levekylinger	Højst 21 kg levende vægt/ m ²	10.000	1 m ² / kylling	10 cm siddepind eller mindst 100 cm ² hævede platforme pr. kylling

Behandling og velfærd

- Særlige regler for velfærd omfatter bl.a. maks. grænser for dødelighed, fjerpilning og kannibalisme.
- Ved problemer med fjerpilning se [Hjælpeskema til udarbejdelse af handlingsplan for fjerkræ på lbst.dk](https://lbst.dk/bedrift/oekologi/praktisk-om-indberetning-hvis-du-er-oekolog/indberetning-af-) (<https://lbst.dk/bedrift/oekologi/praktisk-om-indberetning-hvis-du-er-oekolog/indberetning-af->

husdyrproduktion).

- Næbtrimning er ikke tilladt.
- Vaccination og serumbehandling er tilladt og tæller ikke som en behandling i behandlingsskemaet.
- Tilbageholdelsestiden ved behandling med veterinære lægemidler er to gange den normale tilbageholdelsestid, dog altid mindst 48 timer. Det gælder f.eks. ved parasitbehandling, som har den fastsatte tilbageholdelsestid på 0, dvs. at æggene ikke kan sælges som økologiske i behandlingsperioden og 48 timer derefter. Vacciner er undtaget fra de 48 timer.
- Fjerkræ, der er behandlet med f.eks. antibiotika mere end én gang, kan ikke sælges som økologisk.

Husdyr-/medicinlogbog

- Alle behandlinger og indgreb i flokken skal føres i en medicinlogbog, som er en del af den samlede logbog for husdyrproduktionen.
- Oversigt over flokke med registrering af tilgang, afgang og døde dyr skal fremgå af logbogen.
- Adgang til udeareal, foldskifte og tomgangsperiode skal fremgå af logbogen.

Vær opmærksom på

- At Styrelsen certificerer bedriften til økologi og kontrollerer den mindst en gang om året.
- At du skal indsende årlig indberetning om bedriften hvert år i økologiskemaet, i 2026 senest 22. april.
- At alle væsentlige ændringer indberettes året rundt i økologiskemaet.
- At alt husdyrhold (selskabsdyr, eget forbrug og produktion) skal være registreret/opdateret i CHR. Se [landbrugsindberetning.dk](https://landbrugsindberetning.dk/ghi/startside.jsp). (<https://landbrugsindberetning.dk/ghi/startside.jsp>)
- At du kan søge tilskud til økologisk dyrkede arealer hvert år i fællesskemaet senest 22. april. Se lbst.dk/tilskudsguide. (<https://lbst.dk/tilskud-selvbetjening/tilskudsguide>)

Administration af reglerne

Reglerne administreres af Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Innovationscenter for Økologisk Landbrug tager forbehold for ændringer i praksis.

STØTTET AF

Promilleafgiftsfonden for landbrug

Måske er du også interesseret i



07.01.2026

Fugleinfluenza: Når du skal holde hønerne på stald

I tilfælde af fugleinfluenza og offentligt påbud om, at hønerne ikke må være ude,...



05.01.2026

Budgetkalkuler for økologisk landbrug

Brug budgetkalkulerne og få et realistisk billede af produktionsøkonomien.



19.12.2025

Ensilerings- og konserveringsmidler til øko-foder og drikkevand - sådan må de bruges

Økologiske landmænd må gerne bruge syre til konservering herunder...



22.08.2025

Afgrødens økologiske status afhænger af høsttidspunktet

Hvis høsttidspunktet ændrer sig i forhold til det normale/planlagte, er det vigtigt at...



06.01.2026

Gode råd om at lukke høns ud

Økologiske høns må igen komme ud under åben himmel efter måneders staldpligt og...



21.03.2025

OrganicXlivestock - den danske økologiske husdyrdatabase


LIST BESKRIVELSE MANGLER



20.02.2025

Velkommen til økologien

Vigtige tips til at komme godt fra start som ny økolog og erfaringer med forskellige...



20.02.2025

Regler for husdyrhold til eget brug og selskabsdyr

Når du søger om certificering til økologisk drift for din bedrift, så skal alle de dyr, der er på...



20.02.2025

Regler for økologiske slagtekyllinger

Det følgende giver i kort form overblik over de vigtigste regler inden for økologisk opdræt a...



21.03.2025

Budgetkalkule for fjerkræ er opdateret

Flere æg, men højere foderomkostninger – nye budgetkalkuler indregner de...



01.10.2025

Biostimulanter effekt på høns kendes ikke

Effekten af biostimulanter er svært at dokumentere, og det er derfor svært at konkluder...



12.09.2025

Pil er et hit hos økologiske høner – når det er ensileret

Pil kan bidrage til at gøre jorden mere robust over for ekstreme vejrhændelser som...

Tilmeld dig vores ugentlige nyhedsbrev

Kontakt



Birgit Ingvorsen

Chefkonsulent

+45 23 74 37 98

biin@icoel.dk



Birgitte Hemmingsen

Konsulent

+45 21 79 56 13

bihe@icoel.dk