
Udgivet 01.09.2026

Klimavirkemidler i økologisk planteavl relateret til afgrødevalg og -dyrkning

Afgrøder med stort kvælstofoptag og efterafgrøder i sædskiftet er bare nogle af de muligheder, som du har for at sænke klimaeffekten fra din bedrift.

Af Erik Fog

Find information om de enkelte virkemidler, der er relateret til økologiske afgrøder i oversigten herunder.



Klimavirkemidler i økologisk planteavl

Efterafgrøder i sædskiftet

Ved dyrkning af efterafgrøder reduceres kvælstofudvaskningen og dermed indirekte lattergasudledningen, og der lagres samtidig kulstof, både når efterafgrøden er i vækst, og når den nedmuldes. Efterafgrøder er også med til at mindske gødningsbehovet til den efterfølgende afgrøde, hvilket påvirker klimaregnskabet i en positiv retning. I områder med risiko for fosfortab, kan efterafgrøder desuden bidrage til at mindske eventuelt tab ved store nedbørsmængder.

Der vil dog samtidig være en lattergasemission, når de nedmuldede planterester nedbrydes i jorden, men det vurderes, at den samlede klimaeffekt ved kulstoflagring, mindsket kvælstofudvaskning og reduceret gødningsforbrug overstiger

udledningen ved omsætningen af efterafgrøden.

Hvor meget kulstof, der lagres, hvor meget gødningsbehovet reduceres, samt hvor meget lattergas, der udledes ved omsætning, afhænger dog af flere faktorer som valg af arter, efterafgrødens C/N-forhold, mængden af plantemasse samt jordforhold under nedmuldning.

Reduceret emission: N og C tabseffekter fra jord
Kan beregnes i ESGreen Tool: Ja

Bæredygtighed	Score 0-3
Klima	3
Vand og luft	3
Biodiversitet	3
Jordfrugtbarhed	3
Husdyrsundhed	0
Energiforbrug	1
Ressourceforbrug	1
Sociale forhold	0
Ledelse	0
Økonomisk robusthed	1
Kræver nye investeringer	0

Skemaet viser, hvor meget klimavirkemidlet er vurderet til også at påvirke andre bæredygtighedsparametre. 0 betyder ingen eller negativ effekt, mens 1 til 3 er stigende positiv effekt. Ift. ledelse angiver scoren, hvor meget ekstra ledelse, der er behov for, ift. økonomisk robusthed angiver scoren, i hvor høj grad klimatiltaget vil bidrage positivt til driftsøkonomien, og ift. nye investeringer angiver scoren, hvor store investeringer, der bliver behov for, for at implementere virkemidlet i praksis.

Læs mere:

- Efterafgrøder er godt for klima og miljø (icoel.dk) (/klima/efterafgroeder-er-godt-for-klima-og-miljoe/)
- Vejledning i dyrkning af økologiske efterafgrøder (icoel.dk) (/planteavl/dyrkningsvejledning-oekologiske-efterafgroeder/)
- Økologiske efterafgrøder, der virker i praksis (icoel.dk) (/planteavl/efterafgroeder-der-virker-i-praksis/)
- Efterafgrøde-app'en (icoel.dk) (/planteavl/appen-efterafgroeder/)

Dyrk mere kløvergræs

Kløvergræs er kvælstofmotoren i økologisk planteavl. Det samler store mængder kvælstof, der kan erstatte indkøbt gødning, og samtidig er det en effektiv afgrøde til at indbygge kulstof i jordens organiske materiale. Det giver således en positiv klimaeffekt på flere måder.

Hvis kløvergræsset høstes til bioraffinering, vil der blive produceret proteinkoncentrat, der kan erstatte importeret protein, hvilket også giver en positiv klimaeffekt, og derefter vil resterne kunne bruges til biogasproduktion, så der også kommer et klimabidrag ved at fortrænge naturgas med bionaturgas.

I forbindelse med Den Grønne Trepart kan det tænkes, at man vil udlægge store arealer med græs, og det vil forstærke mulighederne for at udnytte kløvergræssets store klimapotentiale.

De store mænger planterester, der omsættes i jorden, når kløvergræsset pløjes om, vil dog også kunne give anledning til en del lattergas. Det kan begrænses ved at have kløvergræsset liggende i flere år.

Reduceret emission: Lattergas fra mindsket gødningsindkøb og CO_2 bundet i jorden og fra sparet import af proteinfoder og fra fortrængt naturgas

Kan beregnes i ESGreen Tool: Ja

Se video: kløvergræs som klimavirkemiddel

Kløvergræs opbygger kulstof i jorden, og skaber en bedre jordstruktur, der gør jorden bedre rustet til både at modstå store regnmængde, og samtidig være mere tørkeresistent. Samtidig kan kløvergræs være med til at fortrænge noget fossil energi, hvis græsset udnyttes til biogas. Det er bare nogle af de positive egenskaber ved kløvergræs, som gør det til et klimavirkemiddel at have kløvergræs i sit økologiske sædskifte. Kløvergræs er også med til at reducere kvælstofudvaskningen fra din bedrift og kan dermed være et middel i den grønne trepart.

Bæredygtighed	Score 0-3
Klima	3
Vand og luft	3
Biodiversitet	2
Jordfrugtbarhed	3
Husdyrsundhed	1
Energiforbrug	1
Ressourceforbrug	0
Sociale forhold	1
Ledelse	0
Økonomisk robusthed	0
Kræver nye investeringer	0

Skemaet viser, hvor meget klimavirkemidlet er vurderet til også at påvirke andre bæredygtighedsparametre. 0 betyder ingen eller negativ effekt, mens 1 til 3 er stigende positiv effekt. Ift. ledelse angiver scoren, hvor meget ekstra ledelse, der er behov for, ift. økonomisk robusthed angiver scoren, i hvor høj grad klimatiltaget vil bidrage positivt til driftsøkonomien, og ift. nye investeringer angiver scoren, hvor store investeringer, der bliver behov for, for at implementere virkemidlet i praksis.

Afgrøder med stort kvælstofoptag om efteråret

Afgrøder som roer, fodergræs og frøgræs har en lang vækstsæson og et stort kvælstofoptag om efteråret; Derfor kan dyrkning af disse afgrøder medvirke til at reducere kvælstofudvaskning og i forskellig grad lagre kulstof. Der er særligt potentiale i at omlægge f.eks. korn til permanente græsarealer. Nedenfor fremgår de mulige klimaeffekter for afgrøderne.

Sukkerroer: 74 kg CO_2-ækv./ha, sammenlignet med korndyrkning med udgangspunkt i, at roetoppen ikke fjernes.

Frøgræs: 3 tons CO_2-ækv/ha, ved permanent skift til frøgræs sammenlignet med korndyrkning, inkl. en estimeret kulstoflagring, da der mangler empirisk data.

Fodergræs, renbestand: 670 kg CO_2-ækv/ha, Ved permanent skifte til fodergræs sammenlignet med korndyrkning inkl. en estimeret kulstoflagring, da der mangler empirisk data.

Fodergræs med bælgplanter: 1,3 tons CO_2-ækv/ha ved permanent skifte til fodergræs sammenlignet med korndyrkning inkl. en estimeret kulstoflagring, da der mangler empirisk data.

Kilde: Virkemidler til reduktion af klimagasser i landbruget - 2024 (Rådgivningsrapport fra DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug) (https://pure.au.dk/ws/portalfiles/portal/380624507/Klimavirkemiddelkataloget_2024_inkl._boblerlisten_10.06.2024.pdf)
Bemærk, at denne rapport også indeholder virkemidler, der ikke må anvendes i økologisk jordbrug.

Reduceret emission: N og C tabseffekter fra jord
Kan beregnes i ESGreen Tool: Ja

Bæredygtighed	Score 0-3
Klima	3
Vand og luft	2
Biodiversitet	2
Jordfrugtbarhed	2
Husdyrsundhed	0
Energiforbrug	1
Ressourceforbrug	1
Sociale forhold	0
Ledelse	0
Økonomisk robusthed	0
Kræver nye investeringer	0

Skemaet viser, hvor meget klimavirkemidlet er vurderet til også at påvirke andre bæredygtighedsparametre. 0 betyder ingen eller negativ effekt, mens 1 til 3 er stigende positiv effekt. Ift. ledelse angiver scoren, hvor meget ekstra ledelse, der er behov for, ift. økonomisk robusthed angiver scoren, i hvor høj grad klimatiltaget vil bidrage positivt til driftsøkonomien, og ift. nye investeringer angiver scoren, hvor store investeringer, der bliver behov for, for at implementere virkemidlet i praksis.

Læs mere:

- Rapport om stribedyrkning af roer (Nordic Beet Research, PDF 6 sider) (/media/0tgeor5v/dyrkning-af-sukkerroer-i-et-stribebaseret-saedskifte.pdf)
- Dyrkningsvejledning alm. rajgræs til frø (icoel.dk) (/planteavl/dyrkningsvejledning-oekologisk-rajgraes-til-froe/)
- Dyrkningsvejledning sukkerroer (icoel.dk) (/planteavl/oekologiske-sukkerroer-dyrkningsvejledning/)

Flerårige energiafgrøder i sædskiftet

Flerårige energiafgrøder som pil, poppel og elefantgræs er typisk anvendt som biomasse til energiproduktion, hvoraf pil er den mest udbredte. Pil og poppel kan også anvendes til mange andre formål, herunder kompost, skovlandbrug og byggematerialer. Elefantgræs kan desuden anvendes til tækning, dybstrøelse og som alternativ til halmdækning af gulerødder. Flerårige energiafgrøder kan også plantes i områder med behov for reduktion i nitratudvaskning for at opfylde EU's Vandrammedirektiv.

Pil og poppel kan høstes med et interval på mellem 2 og 10 år (For poppel er det muligt at have en længere rotation). Elefantgræs høstes årligt. De flerårige energiafgrøder har en levetid på ca. 10-30 år.

Klimamæssigt bidrager flerårige energiafgrøder via et dybt, permanent rodnet til at mindske kvælstofudvaskning og at lagre kulstof. Energiafgrøder har samtidig et mindre kvælstofbehov end flere andre landbrugsafgrøder (for pil regnes der typisk med en gødningsnorm på 120 kg N/ha). Det vurderes, at omlægning til energiafgrøder kan give en årlig reduktion på ca. 1,34 ton CO_2-ækv/ha, men der er dog usikkerhed omkring beregning af bidraget fra kulstoflagring.

Flerårige energiafgrøder etableret efter planperioden 2008/09 kan erstatte lovpligtige efterafgrøder (0,8 ha energiafgrøder erstatter 1 ha efterafgrøder).

Se også virkemidlet efterafgrøder længere nede på denne side.

Reduceret emission: N og C tabseffekter fra jord. Årlig reduktion på ca. 1,34 ton CO_2-ækv/ha.
Kan beregnes i ESGreen Tool: Ja

Bæredygtighed	Score 0-3
Klima	3
Vand og luft	3
Biodiversitet	1
Jordfrugtbarhed	3
Husdyrsundhed	1
Energiforbrug	2
Ressourceforbrug	1
Sociale forhold	0
Ledelse	0
Økonomisk robusthed	1
Kræver nye investeringer	1

Skemaet viser, hvor meget klimavirkemidlet er vurderet til også at påvirke andre bæredygtighedsparametre. 0 betyder ingen eller negativ effekt, mens 1 til 3 er stigende positiv effekt. Ift. ledelse angiver scoren, hvor meget ekstra ledelse, der er behov for, ift. økonomisk robusthed angiver scoren, i hvor høj grad klimatiltaget vil bidrage positivt til driftsøkonomien, og ift. nye investeringer angiver scoren, hvor store investeringer, der bliver behov for, for at implementere virkemidlet i praksis.

Læs mere:

- Flerårige afgrøder (landbrugsinfo.dk) (https://www.landbrugsinfo.dk/public/f/1/8/miljotiltag_fleraarige_afgroeder#Etablering_og_drift)
- B3 Faktablad: arealændringer i risikoområder (AU) (https://pure.au.dk/ws/files/3074433/B3_N_Faktablad.pdf)
- Dyrkningsvejledning for energipil (landbrugsinfo.dk, kræver login) (https://www.landbrugsinfo.dk/basis/5/9/b/afgroder_dyrkningsvejledning_energipil)
- Dyrkningsvejledning for Poppel (Populus L.) (Robust-Skovlandbrug.dk) (https://robust-skovlandbrug.dk/dyrkningsvejledninger/poppel-populus-l/)
- Poppel som energiafgrøde på landbrugsjord (Skovdyrkerne.dk) (https://skovdyrkerne.dk/medlemsblade/skovdyrkeren-3/poppel-som-energiafgroede-paa-landbrugsjord/)

Mellemafgrøder

En mellemafgrøde etableres før høst på arealer, hvor der efterfølgende sås vintersædsafgrøder samme efterår. En mellemafgrøde opsamler kvælstof efterladt af hovedafgrøden og bidrager således til at holde på nærringstoffer til den efterfølgende vinterafgrøde, hvorved kvælstofudvaskning og lattergasemission potentielt reduceres.

Som mellemafgrøde anvendes typisk olieræddike eller gul sennep. I sædskifter med raps eller kartoffel anbefales det at anvende olieræddike frem for gul sennep, da olieræddike har bedre evne til at sanere for fritlevende nematoder og mindre

tendens til at opformere kålbrok.

Mellemafgrøden skal efter gældende lovgivning være udlagt senest 20. juli og må ikke nedmuldes før 20. september. Mellemafgrøder kan erstatte pligtige efterafgrøder med en omregningsfaktor på 2 ha mellemafgrøder til 1 ha efterafgrøder.

Se også virkemiddel efterafgrøder.

Ved dyrkning af mellemafgrøder vurderes den samlede mulige klimaeffekt ved reduceret kvælstof-udvaskning minus dieselforbrug til såning til at være 455 kg CO_2-ækv./ha. Der er dog usikkerhed omkring beregning af bidraget fra kulstoflagring.

Kilder: Vejledning i dyrkning af mellemafgrøder (Landbrugsinfo.dk) (kræver login) (https://www.landbrugsinfo.dk/basis/c/7/9/godskning_vejledning_dyrkning_af_mellemafgroder)

Reduceret emission: N og C tabseffekter fra jord. 455 kg CO_2-ækv/ha.
Kan beregnes i ESGreen Tool: Ja

Bæredygtighed	Score 0-3
Klima	2
Vand og luft	1
Biodiversitet	1
Jordfrugtbarhed	1
Husdyrsundhed	0
Energiforbrug	1
Ressourceforbrug	1
Sociale forhold	0
Ledelse	0
Økonomisk robusthed	1
Kræver nye investeringer	0

Skemaet viser, hvor meget klimavirkemidlet er vurderet til også at påvirke andre bæredygtighedsparametre. 0 betyder ingen eller negativ effekt, mens 1 til 3 er stigende positiv effekt. Ift. ledelse angiver scoren, hvor meget ekstra ledelse, der er behov for, ift. økonomisk robusthed angiver scoren, i hvor høj grad klimatiltaget vil bidrage positivt til driftsøkonomien, og ift. nye investeringer angiver scoren, hvor store investeringer, der bliver behov for, for at implementere virkemidlet i praksis.

Læs mere:

- Potentiale for at hæve de økologiske udbytter (/planteavl/potentiale-for-hoejere-oekologiske-udbytter/) (icoel.dk)
- Mellemafgrøde af kløver i havre (icoel.dk) (/planteavl/effekter-af-mellemafgroede-af-kloever-i-havre/)

Tidlig såning af vintersæd

Formålet med at så vintersæd tidligt er at mindske kvælstofudvaskning. Tidlig såning senest 7. september af vinterhvede, vinterbyg, vinterrug eller triticale kan erstatte efterafgrøder. Virkemidlet vi ofte kræve en god forfrugt, f.eks. ært eller raps, og kan bevirke et forhøjet ukrudtstryk. Læs mere i dyrkningsvejledningerne nedenfor.

Klimaeffekten knyttet til mindsket kvælstofudvaskning ved tidlig såning af vintersæd er vurderet til 58 kg CO_2-ækv./ha i sammenligning med såning af vintersæd til normal tid (oktober/november).

Kilde: Virkemidler til reduktion af klimagasser i landbruget - 2024 (Rådgivningsrapport fra DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug) (https://pure.au.dk/ws/portalfiles/portal/380624507/Klimavirkemiddelkataloget_2024_inkl._boblerlisten_10.06.2024.pdf) (Bemærk, at denne rapport også indeholder virkemidler, der ikke må anvendes i økologisk jordbrug)

Reduceret emission: N og C tabseffekter fra jord. 58 kg CO_2-ækv/ha.
Kan beregnes i ESGreen Tool: Ja

Bæredygtighed	Score 0-3
Klima	1
Vand og luft	1
Biodiversitet	0
Jordfrugtbarhed	0
Husdyrsundhed	0
Energiforbrug	0
Ressourceforbrug	0
Sociale forhold	0
Ledelse	0
Økonomisk robusthed	0
Kræver nye investeringer	0

Skemaet viser, hvor meget klimavirkemidlet er vurderet til også at påvirke andre bæredygtighedsparametre. 0 betyder ingen eller negativ effekt, mens 1 til 3 er stigende positiv effekt. Ift. ledelse angiver scoren, hvor meget ekstra ledelse, der er behov for, ift. økonomisk robusthed angiver scoren, i hvor høj grad klimatiltaget vil bidrage positivt til driftsøkonomien, og ift. nye investeringer angiver scoren, hvor store investeringer, der bliver behov for, for at implementere virkemidlet i praksis.

Læs mere:

- Vejledning til dyrkning af økologisk vintertriticale (icoel.dk) (/planteavl/dyrkningsvejledning-oekologisk-vintertriticale/)
- Vejledning til dyrkning af økologisk vinterbyg (icoel.dk) (/planteavl/dyrkningsvejledning-oekologisk-vinterbyg/)
- Vejledning til dyrkning af økologisk vårhvede (icoel.dk) (/planteavl/dyrkningsvejledning-oekologisk-vaarhvede/)
- Vejledning til dyrkning af økologisk vinterrug (icoel.dk) (/planteavl/dyrkningsvejledning-oekologisk-vinterrug/)

Kulstoflagrende tiltag

Tiltag, som tilfører store mængder kulstof til jorden, medvirker til en potentiel opbygning af kulstof i jorden, og en vedligeholdelse af eksisterende kulstofpuljer. Disse tiltag inkluderer græs og kløvergræs i sædskiftet, efterafgrøder, mellemafgrøder, halmnedmuldning og tilførsel af organisk gødning. Især græs har en vigtig funktion i forhold til at opbygge kulstof i jorden, og det er især processer omkring de levende rødder, der er vigtige for kulstoflagringen, mens tilførsel af dødt organisk materiale har en mindre effekt.

Det er et krav i økologireglerne, at kulstoflagrende afgrøder skal udgøre 50% af bedriftens totale areal med hoved-, mellem- og efterafgrøder.

Det drøftes også, om tilførsel af biokul er en attraktiv måde at øge jordens kulstofindhold på, fordi biokul nedbrydes meget langsomt, og derfor er et langtidssikret kulstoftilskud. Det er endnu ikke mange steder, det er muligt at anskaffe sig biokul, og biokul kan være dyrt i indkøb. Det er desuden ikke afklaret, hvordan det skal indregnes i klimaberegningerne. Det er også vigtigt at være opmærksom på, at biokul ikke bidrager til jordlivet som nedbrydeligt organisk materiale, f.eks. husdyrgødning og planterester.

Hvorvidt der opnås lagring af kulstof i jorden afhænger af det eksisterende kulstofindhold i jorden. Kulstof i jorden er nemlig en ligevægt imellem det, der tilføres, og det, som tabes igennem mikrobiel omsætning og frigivelse af CO_2. Der opnås typisk mere kulstoflagring ud af det tilførte kulstof, når jordens indhold er lavt, og hvis der tilføres år efter år, vil den årlige kulstoflagring blive mindre med årene. Potentialet for kulstoflagring er større på lerjord end på sandjord.

Det er mindst lige så vigtigt at opretholde de kulstoflagre, der allerede eksisterer i jorden som at lagre nyt, dvs. sikre, at der ikke tabes CO_2 fra jorden til atmosfæren. Derfor skal de kulstoflagrende tiltag i sædskiftet prioriteres uanset eksisterende kulstofindhold i jorden.

Øget kulstofindhold i jorden øger også jordens robusthed over for klimaforandringer. Jorde med et højt indhold af organisk materiale har en bedre struktur, så vand lettere trænger ned i jorden, hvilket reducerer risikoen for erosion og overfladeafstrømning ved kraftig nedbør. Samtidig øger det jordens vandholdende evne, så afgrøderne i højere grad kan modstå perioder med tørke.

Læs mere om klimavirkemidler ved efterafgrøder og kløvergræs i Klimavirkemidler i økologisk planteavl relateret til afgrødevalg og -dyrkning (icoel.dk) (/klima/klimavirkemidler-i-oekologisk-planteavl-relateret-til-afgroeder/).

Læs mere om klimavirkemidler ved organisk gødning i Klimavirkemidler i økologisk planteavl relateret til gødning (icoel.dk) (/klima/klimavirkemidler-i-oekologisk-planteavl-relateret-til-goedskning/)

Kan beregnes i ESGreen Tool: Ja (de fleste tiltag, dog ikke biokul)

Bæredygtighed	Score 0-3
Klima	2
Vand og luft	2
Biodiversitet	1
Jordfrugtbarhed	3
Husdyrsundhed	0
Energiforbrug	0
Ressourceforbrug	1
Sociale forhold	0
Ledelse	0
Økonomisk robusthed	1
Kræver nye investeringer	0

Skemaet viser, hvor meget klimavirkemidlet er vurderet til også at påvirke andre bæredygtighedsparametre. 0 betyder ingen eller negativ effekt, mens 1 til 3 er stigende positiv effekt. Ift. ledelse angiver scoren, hvor meget ekstra ledelse, der er behov for, ift. økonomisk robusthed angiver scoren, i hvor høj grad klimatiltaget vil bidrage positivt til driftsøkonomien, og ift. nye investeringer angiver scoren, hvor store investeringer, der bliver behov for, for at implementere virkemidlet i praksis.

Læs mere

- Kulstoflagring på landbrugsjord (PDF 55 sider, SEGES Innovation) (https://segesinnovation.dk/media/s4ja3h4m/hvordan-oeger-vi-kulstoflagring-paa-landbrugsjord.pdf)
- Opgørelse af klimaeffekt ved kulstoflagring (LandbrugsInfo.dk) (https://www.landbrugsinfo.dk/basis/0/6/e/jord_jordbearbejdning_klimaeffekt_kulstoflagring)

Læs om andre klimavirkemidler indenfor planteavl



01.09.2025

Klimavirkemidler i økologisk planteavl relateret til gødskning

Klimaoptimeret gødskning ved f.eks. nedfældning eller anvendelse af plantebaseret gødning eller br…



01.09.2025

Klimavirkemidler i økologisk planteavl relateret til maskinarbejde

Reduceret dieselforbrug og pløjefri dyrkning er nogle af de muligheder, du har for at sænke klimaeffekte…




01.09.2025

Klimavirkemidler i økologisk planteavl relateret til ekstensivering

Hæv vandstanden på organojorde og etabler bræmmer langs vandløb og åer er nogle af de muligheder,…

Læs om klimavirkemidler inden for andre produktionsgrene



01.09.2025

Klimavirkemidler i økologisk kvæghold


Hyppig gylleudslusning og optimeret grovfoderproduktion er nogle af de muligheder, du har for…



01.09.2025

Klimavirkemidler i økologisk griseproduktion


Optimeret fodring og bedre gødningshåndtering er nogle af de muligheder, du har for at sænke…



01.09.2025

Klimavirkemidler i økologisk fjerkræ- og ægproduktion

Bedre gødningshåndtering, varmeveksler og fokus på at undgå proteinoverskud er nogle af de…



01.09.2025

Klimavirkemidler i økologisk grøntsagsproduktion

Bedre gødning og dyrkningsmedie, energieffektivitet og fokus på kulstofopbygning er nogle af de…



01.09.2025

Klimavirkemidler i øvrige dyrkningssystemer i økologisk produktion

Skovlandbrug og paludikultur kan med fordel etableres på den økologiske bedrift for at sænke…



01.09.2025

Klimavirkemidler på den økologiske bedrift relateret til bygninger

Optimer og reducer strømforbruget i dine bygninger for at sænke din bedrifts klimabelastning.



01.09.2025

Økonomi i klimatiltag på din økologiske bedrift

Når du som landmand overvejer virkemidler til reduktion af bedriftens udledninger, er det…

Økologiens virkemiddelkatalog



Økologiens virkemiddelkatalog

Få overblik over de klimavirkemidler, der er relevante for din økologiske produktion.

Finansieret af
Den Europæiske Union
NextGenerationEU

STØTTET AF
Promilleafgiftsfonden for landbrug

Læs om andre virkemidler, som kan sænke klimabelastningen af din økologiske produktion:



31.08.2026

Klimaaftryk på bedriftsniveau: betydningen af import

Import af foder og andre hjælpestoffer har stor betydning for bedriftens samlede udledning,…



17.09.2026

Dansk forskning undersøger udledning af metan fra køer på græs

Undersøgelser fra Holland og foreløbige resultater fra Danmark tyder på, at græssende køer…



24.09.2026

EU forenkler krav til ESG-rapportering


Landbrugssektoren skal ikke have særskilte krav til ESG-rapporteringen, men forenklingen…



07.09.2026

Landbrugets kilder til udledning af CO2

Den største kilde til CO2-udledning er brugen af fossil energi.



01.10.2026

Beregning af klimaaftryk kræver et præcist datagrundlag

Det er en stor udfordring, at datagrundlaget for beregninger af landbrugets klimaaftryk ikke tag…



31.08.2026

Rapport: Økologi er et klimavirkemiddel

Økologi er i sig selv et klimavirkemiddel. Omlægning til økologi er med på SEGES…



09.09.2026

Normtal for beregning af klimaaftryk kan ramme skævt for økologiske grise og fjerkræ

De nuværende normtal, der danner grundlag for at beregne klimaaftryk fra grisehold og fjerkræproduktio…



09.10.2026

Sverige: Mindre tab i økologisk produktionskæde for oksekød

Tabet af dyr, som ellers ville nå frem til slagtning og blive til oksekød, er lavere i økologisk kødproduktion…



30.09.2026

Anbefalinger om kulstoffangst og -lagring i landbrugsjord

Et ekspertudvalg har afleveret en rapport med anbefalinger til tiltag, der kan fremme kulstoflagring i…



30.09.2026

Landmænd: S'et i ESG er svært at sætte i skema

Innovationscenter for Økologisk Landbrug har fået lavet en interviewundersøgelse blandt…



31.08.2026

Klimaeffekt af køer på græs

Alle køer udleder metan pga. de fordøjelsesprocesser, der foregår i vommen. Samtidig udledes meta…



05.08.2026

Ny analyse af klimaaftrykket fra økologisk fjerkræ på vej

Innovationscenter for Økologisk Landbrug barsler med nye beregninger, der vil sammenligne…

Tilmeld dig vores ugentlige nyhedsbrev

Kontakt



Erik Fog

Chefkonsulent

+45 51 80 86 69

eikf@icoel.dk