

[Forside \(/\)](#) / [Regler \(/regler/\)](#) / [Regler for goldbehandling hos kvæg \(/regler/regler-for-goldbehandling-hos-kvaeg/\)](#)
Udgivet 20.09.2026

Regler for goldbehandling i økologiske kvægbesætninger

Behandling af køer ved goldning i økologiske besætninger kræver fokus på, hvornår behandling er tilladt, og på varigheden af den dobbelte tilbageholdelsestid for det anvendte præparat.

Af Birgit Ingvorsen

Ved goldbehandling i økologiske besætninger gælder:

- Fødevarestyrelsens generelle regler
- EU-regler for økologisk produktion
- Brancheanbefalinger for økologiske kreaturer (skærpede krav i forhold til de øvrige regler)

Antibiotika ved goldning kræver fund af bestemte bakterier i mælkeprøve

Antibiotikabehandling af en ko ved goldning kræver, at der er fundet B-streptokokker, Staph. aureus, Strep. uberis, Strep. dysgalactia eller Trueperella pyogenes i en mælkeprøve. Der kan derefter anvendes alle de goldningspræparater, som er tilgængelige. Det gælder også bredspektrede antibiotika, da der ikke i øjeblikket findes godkendte produkter med smalspektret penicillin på det danske marked.

De generelle regler for goldbehandlinger af malkekvæg, hvor køer, som har haft over 200.000 i celletal på 2 ydelseskontroller inden for de sidste 4 mdr. før goldning, kan blive goldbehandlet med antibiotika, kan ikke anvendes i økologiske besætninger.

Læs mere om skærpede regler for behandling i [Brancheanbefalinger for økologiske kreaturer \(/regler/brancheanbefalinger-for-oekologiske-kreaturer/\)](#) – pkt. 1.1.2 (icoel.dk)

Læs mere om behandling, behandlingsregnskab, medicinlogbog, tilbageholdelsestider m.v. i afsnit 34 i [V \(https://lbst.dk/bedrift/oekologi/bliv-certificeret-oekolog/vejledning-om-oekologisk-jordbrugsproduktion\)](#) vejledning om økologisk jordbrugsproduktion (lbst.dk) (<https://lbst.dk/bedrift/oekologi/bliv-certificeret-oekolog/vejledning-om-oekologisk-jordbrugsproduktion>) og i Bilag 5. Oversigt over reglerne for behandling i økologiske besætninger.

Læs mere om de generelle regler for dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinerings m.v. af lægemidler til dyr i bekendtgørelse nr. 1186 af 3. oktober 2025 (retsinformation.dk) (<https://www.retsinformation.dk/eli/lt/2025/1186>).

Dobbelt tilbageholdelsestid ved behandling

EU-regler for økologisk produktion kræver altid den dobbelte tilbageholdelsestid for alle medicinske

behandlinger i økologiske besætninger, og som udgangspunkt minimum 48 timer, hvilket også gælder de produkter, som har en generel tilbageholdelsestid på 0 timer. Eneste undtagelse fra dette krav er vacciner.

Lægemiddelstyrelsen fastsætter den generelle tilbageholdelsestid for det enkelte præparat, og den kan være formuleret på mange forskellige måder, hvilket kan gøre det uoverskueligt at beregne den rigtige dobbelte tilbageholdelsestid i økologiske besætninger. Specielt for en række midler til goldbehandlinger. I skemaet nedenfor er det for forskellige præparater til goldbehandling vist, hvordan tilbageholdelsestiden er i økologiske besætninger.

Eksempler på midler til goldbehandling og beregning af økologisk tilbageholdelsestid

Produkt	Generel tilbageholdelsestid for mælken fastsat af Lægemiddelstyrelsen	Økologisk tilbageholdelsestid for mælken
CEFAGOLD® VET.	Hvis interval mellem behandling og kælvning er 32 dage eller mere, er tilbageholdelsestiden 24 timer efter kælvning	2x24 timer efter kælvning eller
	Hvis interval mellem behandling og kælvning er mindre end 32 dage, er tilbageholdelsestiden 33 dage efter behandling	2x33 dage efter behandling
ORBENIN® VET.	37 døgn efter behandling	2x37 døgn efter behandling uanset kælvningstidspunkt
BENESTERMYCIN® VET.	Hvis koen er behandlet mindst 35 dage før kælvning, må mælken ikke anvendes i 36 timer efter kælvning	2x36 timer efter kælvning eller
	Hvis koen er behandlet 34 dage eller færre dage før kælvning, må mælken ikke anvendes 37 dage efter behandling	2x37 dage efter behandling

STØTTET AF

Promilleafgiftsfonden for landbrug**Måske er du også interesseret i**



24.09.2026

Regler for strøelse hos økologisk kvæg i sengebåse

Liggepladsen skal være bekvem, ren og tør for alle dyregrupper på...



24.09.2026

Regler for økologiske kalve og ungdyr på græs

4-6 mdr. gamle økologiske kalve skal have adgang til græsarealer i sommerperiod...



18.09.2026

Regler for husdyrhold til eget brug og selskabsdyr

Når du søger om certificering til økologisk drift for din bedrift, så skal alle de dyr, der er på...



29.09.2026

Lokal mangel på økologisk grovfoder

Overvej et ekstra slæt, så rug, indkøb kvalitetsgrovfoder eller reducer besætningen, hvis d...



18.09.2026

Kalve og ungdyr på græs kræver ekstra opmærksomhed om efteråret

LIST BESKRIVELSE MANGLER



16.09.2026

Letland: mælkeproduktion trods modgang

Mælkeproduktionen i Letland er i øjeblikket udfordret af bl.a. lave mælkepriser, men...



18.09.2026

Forebyg parasitter hos kalve og ungdyr på græs

Det er vigtigt at have en strategi fra starten af afgræsningssæsonen – og e...



18.08.2026

Vinterhvedesorter med brødkvalitet i OrganicXseeds

I OrganicXseeds findes økologisk udsæd af både kendte og mindre kendte...



31.08.2026

Klimaeffekt af køer på græs

Alle køer udleder metan pga. de fordøjelsesprocesser, der foregår i vommen. Samtidig...



10.09.2026

Forhøjede fosfornormer for økologiske grise gælder fra 1. august 2026

Samtidig er der forslag om at hæve fosforloftet for bedrifter med økologiske grise til 33 k...



08.07.2026

Kalvedødelighed i ammetantesystemer

Den gennemsnitlige kalvedødelighed ikke højere på 8 bedrifter med...



23.06.2026

Lovgivning om Nye Genomiske Teknikker har betydning for økologer

Nye Genomiske Teknikker (NGT) er forædlingsteknikker, hvor man målrettet ændrer e...

Tilmeld dig vores ugentlige nyhedsbrev

Kontakt



Birgit Ingvorsen

Chefkonsulent

+45 23 74 37 98

biin@icoel.dk