

[Forside \(/\)](#) / [Regler \(/regler/\)](#) / [Regler for økologiske slagtekyllinger \(/regler/regler-for-oekologiske-slagtekyllinger/\)](#)
Udgivet 01.02.2026

Regler for økologiske slagtekyllinger

Det følgende giver i kort form overblik over de vigtigste regler inden for økologisk opdræt af slagtekyllinger og et eksempel på et omlægningsforløb.

Af Birgit Ingvorsen

En fuldstændig oversigt over EU-regler findes i Styrelsens [Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion](https://lbst.dk/bedrift/oekologi/bliv-certificeret-oekolog/oekologisk-jordbrugsproducent) (<https://lbst.dk/bedrift/oekologi/bliv-certificeret-oekolog/oekologisk-jordbrugsproducent>). (<https://lbst.dk/bedrift/oekologi/bliv-certificeret-oekolog/oekologisk-jordbrugsproducent>) Se: lbst.dk/bedrift/oekologi (<https://lbst.dk/bedrift/oekologi>)

Omlægning eller indsættelse af dyr

- Fjerkræhold, der udelukkende er til eget forbrug, behøver du ikke omlægge.
- Kyllinger skal være økologiske eller under tre dage gamle ved indsættelse i det økologiske system.

Foder, grovfoder og tilsætningsstoffer

Afgrødetype til foder	Konventionel afgrøde *)	Omlægningsafgrøde	Økologisk afgrøde
Etårige afgrøder (korn, majs, roer, grønsager m.m.)	Afgrøden er sået før påbegyndt omlægning, eller afgrøden høstes mindre end 12 mdr. efter, jorden er påbegyndt omlægning	Afgrøden er sået efter påbegyndt omlægning, og afgrøden høstes mindst 12 mdr. efter, jorden er påbegyndt omlægning	Afgrøden er sået mindst 24 mdr. efter, jorden er påbegyndt omlægning.
Græs/permanent græs (inkl. kløvergræs, frøgræs, kløverfrø, lucerne)	Afgrøden høstes mindre end 12 mdr. efter, jorden er påbegyndt omlægning	Afgrøden høstes mindst 12 mdr. efter, jorden er påbegyndt omlægning.	Afgrøden høstes mindst 24 mdr. efter, jorden er påbegyndt omlægning

*) Se dog undtagelse for proteinafgrøder til foder ("20 pct.-regel").

- 30 % af foderrationen skal være produceret på egen bedrift eller i Danmark.
- I mineralblandinger må der bruges op til 1% ikke-økologiske urter, krydderier og melasse som bindemiddel (pr. dyr pr. år).

- Indtil den 31. december 2026 må der anvendes 5 % ikke-økologisk proteinfoder til ungfjerkræ (slagtekyllinger), hvis økologisk foder ikke kan skaffes.
- Mineraler er et eksempel på fodermidler, der ikke er af landbrugsoprindelse og tæller derfor ikke med i de 5% ikke-økologisk foder.
- Omlægningsfoder fra bedriftens egne arealer kan udgøre 100 % af foderet (i procent af tørstof af landbrugsoprindelse). Op til 25 % må være indkøbt omlægningsfoder regnet pr. kalenderår.
- Indkøbt omlægningsfoder kan erstatte de 5 % ikke-økologisk foder.
- Foder fra egne marker med flerårige foder- og proteinafgrøder i første omlægningsår kan anvendes med op til 20 % af foderrationen (i procent af tørstof pr. dyr pr. år). Det kan være proteinafgrøder som ærter, hestebønner, lupiner eller blandinger af korn og bælgsæd, samt flerårige foderafgrøder som kløver, græs og lucerne. Gælder også ved lejet græsningsret.
- Foderet må ikke være fremstillet ved brug af kemiske opløsningsmidler, f.eks. skråprodukter.
- Foder, der består af eller er fremstillet ved brug af genetisk modificerede organismer (gmo), må ikke anvendes.
- Foderet må kun indeholde mineralske fodermidler og fodertilægsstoffer som fremgår af bilag 3 i [Vejledningen om økologisk jordbrugsproduktion](https://lbst.dk/bedrift/oekologi/bliv-certificeret-oekolog/oekologisk-jordbrugsproducent) (<https://lbst.dk/bedrift/oekologi/bliv-certificeret-oekolog/oekologisk-jordbrugsproducent>).
- Kyllinger skal fra tre dages alderen tildeles grovfoder, så de er beskæftiget i dagtimerne, f.eks. ensilage, frisk grønt, hør, rodfrugter og grøntsagsrester.

Stalde til økologiske slagtekyllinger

- Stalde til slagtekyllinger må maksimalt være 1600 m². Der kan være flere stalde på en bedrift.
- Der skal være tilstrækkeligt med dagslys i stalden. Naturligt lys igennem vinduer og åbninger, som kan suppleres med kunstig belysning (20 lux i 80% af staldens nettoareal iflg. [Bek. nr. 1747 om dyrevelfærdsmaessige mindstekrav til hold af slagtekyllinger og rugeægsproduktion til produktion af slagtekyllinger samt om uddannelse ved hold af slagtekyllinger](#) (<https://www.retsinformation.dk/eli/lt/2020/1747>)).
- Der skal være en natlig hvileperiode uden kunstigt lys på minimum 8 timer. Fra dag 0 til dag 5 kan mørkeperioden dog opdeles i 2 gange minimum 4 timer, hvor der er en periode med lys på op til to timer. Lys-perioden på 2 timer skal sikre, at dyrene får adgang til foder og vand.
- Ammoniakkoncentrationen i stalden må ikke overstige 20 ppm.
- Mindst 1/3 af staldens gulvareal skal kunne anvendes som skrabe- og støvbadningsareal. Det skal være dækket af tør og porøs strøelse, som kan bestå af sand, jord, halm eller lign.
- Mobile huse til slagtekyllinger skal overholde miljøkrav i [Byggebladet om indretning og flytning af mobile huse til økologiske slagtekyllinger](#) (PDF 7 sider) (<https://icoel.dk/media/i2qfi04g/byggeblad-slagtekyllinger-mobilehuse.pdf>).
- Stalden skal have mindst 4 meter ind- og udgangshuller per 100 m² staldareal (nettoareal). Mellem

inderstald og en AUB (anden udendørs tagbelagt bygningsdel, tidligere veranda) skal der være mindst 2 meter ind- og udgangshuller per 100 m² nettoareal.

- En AUB kan regnes med til nettoarealet, hvis kyllingerne har fri adgang hele døgnet og hele året.

Udearealer (hønsegård)

- Økologiske slagtekyllinger skal have adgang til udearealet mindst en tredjedel af livet. Vær derfor opmærksom på ønsket slagtealder.
- Udearealer kan anvendes fra omlægningsens start, hvis det dokumenteres, at græsoptaget fra de første 12 mdr. ikke overstiger 20 % af den samlede foderration på årsbasis (regler for proteinafgrøder i første omlægningsår).
- Udearealer til fjerkræ skal være attraktive og overvejende dækket af vegetation, som skal bestå af forskellige plantearter. Du skal sørge for, at vegetationen vedligeholdes, så der ikke sker udsivning af næringsstoffer.
- Du skal sørge for, at dyrene anvender hele udearealet jævnt fordelt.
- Der skal etableres ly, buske eller træer fordelt over hele udearealet. Hvis afstanden til yderste ende af hønsegården overstiger 150 meter, skal der være mindst fire steder med ly, buske og træer jævnt fordelt over hele udearealet.
- Der skal være en tomgangsperiode mellem to flokke, som sikrer, at vegetationen kan gro frem igen, og at vegetationskravene er opfyldt for den efterfølgende flok.

Staldtype	Nettoareal	Flokstørrelse	Minimum udeareal	Siddepinde/ platform
Faste huse	Højest 21 kg levende vægt/m ²	4.800	4 m ²	5 cm siddepind eller mindst 25 cm ² hævede platforme pr. kylling
Mobile huse (under 150 m ² , og som flyttes mellem hvert hold)	Højest 30 kg levende vægt/m ²	4.800	4 m ²	5 cm siddepind eller mindst 25 cm ² hævede platforme pr. kylling

Slagtealder og vækst

- Kyllinger, der er økologiske ved indsættelsen og langsomt voksende, kan slagtes når som helst (f.eks. 63 dage).

- Kyllinger, der er ikke-økologiske ved indsættelsen og langsomt voksende, kan slagtes efter omlægningsperioden på 10 uger (70 dage).
- Kyllinger, der ikke er langsomt voksende, må tidligst slagtes efter 81 dage.
- Langsomt voksende kyllingeracers tilvækst må maksimalt være på 38 g/dag (gennemsnit over tre på hinanden følgende hold).

Behandling og velfærd

- Særlige regler for velfærd omfatter bl.a. maks. grænser for dødelighed og fjerpilning.
- Ved problemer med fjerpilning se [Hjælpekema til udarbejdelse af handlingsplan for fjerkræ på lbst.dk](https://lbst.dk/bedrift/oekologi/praktisk-om-indberetning-hvis-du-er-oekolog/indberetning-af-husdyrproduktion) (<https://lbst.dk/bedrift/oekologi/praktisk-om-indberetning-hvis-du-er-oekolog/indberetning-af-husdyrproduktion>).
- Næbtrimning er ikke tilladt.
- Vaccination og parasitbehandling er tilladt, og det tæller ikke som en behandling i behandlingsregnskabet.
- Tilbageholdelsestiden ved behandling med veterinære lægemidler er to gange den normale tilbageholdelsestid dog altid mindst 48 timer. Det gælder f.eks. ved parasitbehandling. Kun vacciner er undtaget fra de 48 timer.

Vær opmærksom på

- At Styrelsen certificerer bedriften til økologisk produktion, og kontrollerer den mindst en gang om året.
- At du skal indsende årlig indberetning om bedriften hvert år i økologiskemaet senest 22. april 2026.
- At alle væsentlige ændringer indberettes året rundt i økologiskemaet.
- At du (eller en medarbejder) skal have gennemført et lovpligtigt kursus om slagtekyllinger inden etablering.
- At husdyrholdet skal være registreret/opdateret i CHR. Se: landbrugsindberetning.dk (<http://landbrugsindberetning.dk>)
- At du kan søge tilskud til økologisk dyrkede arealer hvert år i fællesskemaet senest 22. april.. Se: lbst.dk/tilskud/tilskudsguide (<https://lbst.dk/tilskud/tilskudsguide>)
- Regler for den frivillige dyrevelfærdsmærkningsordning, hvis du ønsker at mærke kyllinger med 3 hjerter. Find regler, tilmelding og vejledninger hos Fødevarestyrelsen.

Administration af reglerne

Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (sgav.dk) administrerer reglerne. Innovationscenter for Økologisk Landbrug tager forbehold for ændringer i praksis.

STØTTET AF

Promilleafgiftsfonden for landbrug

Måske er du også interesseret i



12.02.2026

Vær opmærksom på omlægningsdato på nye marker til foderproduktion


Omlægnings- og sådato er afgørende for, om afgrøder høstes i første omlægningsår...



12.02.2026

Byggeblad til økologiske slagtekyllinger

Miljøministeriet har i en periode arbejdet på at revidere og indarbejde regler fra...



24.02.2026

Regler for økologisk ægproduktion

Få overblik over de vigtigste regler for økologisk ægproduktion og et eksemp...



16.12.2025

Forspiret korn til økologisk fjerkræ og grise

Forspiret korn kan være et godt supplement til traditionelt grovfoder.



16.12.2025

Fjerkræ i skovlandbrug – kom godt i gang

Beplantning i økologiske hønsegårde er et krav. Økologisk mobil fjerkræ-...



10.11.2025

Beplantning i hønsegårde

Beplantning i hønsegårde kræver mange overvejelser. Her finder du aktuel, relevant...



05.11.2025

Klimavirkemidler i økologisk fjerkræ- og ægproduktion

Bedre gødningshåndtering, varmeveksler og fokus på at undgå proteinoverskud er...



19.12.2025

Ensilerings- og konserveringsmidler til øko-foder og drikkevand - sådan må de bruges

Økologiske landmænd må gerne bruge syre til konservering herunder...



22.08.2025

Afgrødens økologiske status afhænger af høsttidspunktet

Hvis høsttidspunktet ændrer sig i forhold til det normale/planlagte, er det vigtigt at...



06.01.2026

Gode råd om at lukke høns ud

Økologiske høns må igen komme ud under åben himmel efter måneders staldpligt og...



21.03.2025

OrganicXlivestock – den danske økologiske husdyrdatabase

LIST BESKRIVELSE MANGLER



20.02.2025

Velkommen til økologien

Vigtige tips til at komme godt fra start som ny økolog og erfaringer med forskellige...

Tilmeld dig vores ugentlige nyhedsbrev

Kontakt



Birgit Ingvorsen

Chefkonsulent

+45 23 74 37 98

biin@icoel.dk



Birgitte Hemmingsen

Konsulent

+45 21 79 56 13

bihe@icoel.dk