

Bælgsæd: Ram den rigtige jordtemperatur

Med det tidlige forår er der godt gang i markarbejdet. Nogle afgrøder skal bare i jorden, så snart den er tjenlig. Det gælder havre, hestebønne og markært.

Tjek jordtemperaturen, inden du sår

Anderledes forholder det sig med andre arter af bælgsæd. Her er der forskellige krav til jordtemperatur ved såning. Tjek derfor altid jordtemperaturen inden, du kører ud og sår.

Det kan gøres på forskellig vis. Du kan bl.a. følge jordtemperaturen på LandbrugsInfo.dk. Her kan du ved hjælp af postnummer se den aktuelle jordtemperatur lokalt og en prognose for udviklingen de kommende syv dage. Jordtemperatur måles i 10 cm's dybde. Det er også den dybde, man skal måle i, hvis man selv går ud med et termometer.

[Tjek jordtemperaturen - Landbrugsinfo](#)

Vær opmærksom på, at prognosen baseres på lufttemperaturen, så hvis der er udsigt til en større nedbørsmængde, kan det få jordtemperaturen til at falde, selv om prognosen ikke viser det.

Anbefalet jordtemperatur	Art
4° C	Lupin
5° C	Linser
7° C	Kikært af <u>Desi</u> -typen (mørke)
10° C	Kikært af <u>Kabuli</u> -typen (lyse) Sojabønne
14° C	Buskbønner (tåler ikke nattefrost)